

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

11.11.2004


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 9月30日
Date of Application:

出願番号 特願2003-341313
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2003-341313]

出願人 サントリー株式会社
Applicant(s):




PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年10月13日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願
【整理番号】 P03-0087
【提出日】 平成15年 9月30日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 C12N 1/19
C12N 1/21
C12N 5/10

【発明者】
【住所又は居所】 滋賀県大津市国分2丁目931-3
【氏名】 小埜 栄一郎

【発明者】
【住所又は居所】 滋賀県大津市仰木の里2-7-4
【氏名】 田中 良和

【特許出願人】
【識別番号】 000001904
【氏名又は名称】 サントリー株式会社

【代理人】
【識別番号】 100080034
【弁理士】
【氏名又は名称】 原 謙三
【電話番号】 06-6351-4384

【選任した代理人】
【識別番号】 100113701
【弁理士】
【氏名又は名称】 木島 隆一

【選任した代理人】
【識別番号】 100116241
【弁理士】
【氏名又は名称】 金子 一郎

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 003229
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

ピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子。

【請求項 2】

ピノレジノール及び／又はピペリトールに対してメチレンジオキシブリッジを形成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする請求項 1 に記載の遺伝子。

【請求項 3】

以下 (a) または (b) のタンパク質をコードする遺伝子。

(a) 配列番号 1 に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質。

(b) 上記アミノ酸配列において、1 個またはそれ以上のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び／又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質。

【請求項 4】

配列番号 1 に示されるアミノ酸配列に対して 50% 以上の相同性を有し、かつピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子。

【請求項 5】

配列番号 2 に示される塩基配列をオープンリーディングフレーム領域として有する遺伝子。

【請求項 6】

配列番号 2 に示される塩基配列、もしくは配列番号 1 に示されたアミノ酸配列をコードする塩基配列、またはそれら塩基配列の一部に対して、ストリンジェンシーな条件下で、ハイブリダイズし、ピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子。

【請求項 7】

ゴマ由来である請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の遺伝子。

【請求項 8】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子によりコードされるタンパク質。

【請求項 9】

以下 (a) または (b) のタンパク質。

(a) 配列番号 1 に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質。

(b) 上記アミノ酸配列において、1 個またはそれ以上のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び／又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質。

【請求項 10】

請求項 8 または 9 に記載のタンパク質を認識する抗体。

【請求項 11】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子を含有する組換え発現ベクター。

【請求項 12】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子を含有する組換え発現ベクターを含む形質転換体。

【請求項 13】

請求項 12 に記載の形質転換体を培養し、又は生育させ、該形質転換体からピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質を採取する工程を含むタンパク質の生産方法。

【請求項 14】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子が導入された植物もしくはこれと同じ性質を有する該植物の子孫またはそれらの組織。

【請求項 15】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子、あるいは請求項 8 または 9 に記載のタンパク質を用いてピペリトールまたはセサミンを生合成する工程を有する、ピペリトール及び／又はセサミンの生産方法。

【請求項 1 6】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子を用いることにより、リグナン高含有の形質転換体を生産する方法。

【請求項 1 7】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子を用いることにより、ピペリトール・セサミン高含有の植物体を生産する方法。

【請求項 1 8】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子を用いることにより、リグナン低含有の形質転換体を生産する方法。

【請求項 1 9】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子を用いることにより、ピペリトール・セサミン低含有の植物体を生産する方法。

【請求項 2 0】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子を用いて、ゴマを育種する方法。

【請求項 2 1】

請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の遺伝子における少なくとも一部の塩基配列またはその相補配列をプローブとして用いた遺伝子検出器具。

【書類名】明細書

【発明の名称】リグナン生合成酵素をコードする遺伝子、およびその利用

【技術分野】

【0001】

本発明は、ゴマのピペリトールおよびセサミンの生合成酵素、当該タンパク質をコードする遺伝子、並びに当該タンパク質および遺伝子の利用に関するものである。

【背景技術】

【0002】

一般的にゴマ (*Sesamum indicum*) として知られている植物は、ゴマ科ゴマ属 (*Sesamum*) に属している。原産地は中央アフリカで、6000年ほどの歴史をもつ最古の栽培油糧植物であり、世界中で栽培されてきた。

【0003】

ゴマ種子の成分としては、約50%の脂質と、約20%のタンパク質が含まれている。このゴマ種子の脂質の主成分はオレイン酸とリノール酸を主体とするトリグリセリドであり、ビタミンB1、B2、Eなども含まれている。なかでもゴマ種子脂質には、特徴的な成分としてセサミン、セサモリンなどのリグナンと総称される植物の二次代謝物が含まれている。

【0004】

このセサミンは多様な生理活性を有することが明らかにされており、コレステロール代謝、肝機能及び免疫機能改善に効果があることが知られている（例えば、非特許文献1参照）。セサミンをゴマ種子あるいはゴマ種子の絞り粕から分離精製する方法はすでに実用化されており（例えば、特許文献1、2参照）、セサミンを主成分とするアルコール分解促進作用を中心とした肝機能活性増強剤が市販されている。また、セサミン以外のゴマリグナン（セサミノール、セサモリンなど）についても生理活性作用が報告されている（例えば、非特許文献2参照）。

【0005】

リグナンの生合成についてはある程度の知見がある（例えば、非特許文献3参照）。図1に、一般的に知られているリグナンの生合成の模式図を示す。リグナンはフェニルプロパノイド化合物を出発物質として合成され、植物においては植物の生体防御機構に寄与していると考えられている。図1に示すように、コニフェリルアルコール1が重合して合成されるピノレジノール2が生合成上は最初のリグナンであり、ピノレジノール2から植物種に特有な生合成経路を経て多様なリグナンが合成されることが知られている。

【0006】

また、セサミンの生合成に関しては、図1に示すように、(+) -ピノレジノール2にピペリトール合成酵素3が作用することによりメチレンジオキシブリッジが一箇所形成され（図中、円で囲んだ領域）ピペリトール4が合成される。次いでこのピペリトール4にセサミン合成酵素5が作用することによりメチレンジオキシブリッジがさらにもう一箇所形成されてセサミン6が合成されることが知られている。さらに、上記両者の反応を触媒する酵素がチトクロームP450であるが、2種類のチトクロームP450であることがゴマ種子の膜画分を用いた実験で示されている（例えば、非特許文献4参照）。

【0007】

上記メチレンジオキシブリッジの形成は、アルカロイドやフラボノイドの生合成においてしばしば見られる。例えば *Eschscholtzia californica* の培養細胞の膜画分には (S)-scoulerine から (S)-cheilanthifoline を、(S)-cheilanthifoline から (S)-stylopine を、ともにメチレンジオキシブリッジを形成することにより生成する反応を触媒するチトクロームP450が存在することが知られている（例えば、非特許文献5参照）。

【0008】

また、ヒヨコマメ (*Cicer arietinum*) の培養細胞の膜画分には、カリコシン (calycosin) にメチレンジオキシブリッジを形成しシュードパプティゲニンを、プラテンセイン (pratenin) にメチレンジオキシブリッジを形成し5'-ヒドキシシュードパプティゲニンを、

生成する反応を触媒する酵素が存在し、その酵素がチトクロームP450であることが報告されている（例えば、非特許文献6参照）。

【0009】

また、*Linum flavum*の培養細胞におけるデオキシポドフィロトキシン(deoxypodophyllo toxin)6-水酸化酵素はチトクロームP450であることが示唆されている（例えば、非特許文献7参照）。

【0010】

また、ベンジルイソキノリンアルカロイドであるベルペリンの生合成に関わり、(S)-tetrahydrocolimbamineからメチレンジオキシブリッジを形成し(S)-tetrahydroberberineを合成する酵素はやはりチトクロームP450であり、これをコードする遺伝子が*Coptis japonica*からクローニングされている（例えば、非特許文献8参照）。

【0011】

上述のような種々の反応を触媒するチトクロームP450は多様な分子種からなるスーパーファミリーを形成しており、そのアミノ酸配列の相同性によって分類される。概ね同一性が40%以上であるものをファミリー、55%以上であるものをサブファミリーとして分類し、ファミリーは数字で、サブファミリーはアルファベットで示される（例えば、非特許文献9参照）。各ファミリー及びその相互関係については、図3に系統樹として示す。例えば、上述したベルペリンの生合成に関わるチトクロームP450はCYP719に属するとされる。

【0012】

チトクロームP450は、ひとつの植物種に数百分子種存在する。けれども、図4に示すように、これらのうち生化学的あるいは生理的な機能が同定されているチトクロームP450分子種は少数である。

【0013】

ゴマ由来のチトクロームP450としては、本発明に関係するセサミンやピペリトールの合成反応とは直接的には関係しないが、p-coumarate 3-hydroxylaseをコードする遺伝子(AY065995)がクローニングされている。

【0014】

他の生物種におけるチトクロームP450遺伝子のクローニングとその機能解析はいくつかの報告がある。

【0015】

例えば、ペチュニア由来のフラボノイド3'、5'水酸化酵素(F3'、5'H)遺伝子（例えば、非特許文献10参照）、フラボノイド3'-水酸化酵素(F3'H、CYP75B)遺伝子（例えば、非特許文献11参照）、カンゾウ由来の(2S)-フラバノン2-水酸化酵素(F2H、CYP93B1)（非特許文献12）、2-ヒドロキシイソフラバノン合成酵素(IFS、CYP93C2)（非特許文献13）、イソフラボン2'-水酸化酵素(I2'H、CYP81E1)（非特許文献14）をコードする遺伝子がクローニングされている。また、キンギョソウからI2'Hを用いてフラボン合成酵素II(FNSII、CYP93B3)（非特許文献15）をコードする遺伝子がクローニングされている。

【0016】

また、CYP81ファミリーに属するチトクロームP450のアミノ酸配列は HYPERLINK "http://drnelson.utmem.edu/CytochromeP450.html" http://drnelson.utmem.edu/CytochromeP450.html に数多く記載されている。それらの機能としては、*Helianthus tuberosus*由来のCYP81B1が脂肪酸の水酸化反応を触媒すること（非特許文献16）、前述のI2'HがCYP81Eに属することが知られている。

【0017】

けれども、これらのチトクロームP450が触媒する反応は、上述したようなメチレンジオキシブリッジ形成の反応ではない。

【0018】

リグナンの生合成に関わる酵素の遺伝子としては、ピノレジノールの合成に寄与する *di rigent protein* が、レンギョウ (*Forsythia intermedia*) などから報告されている (例えば、非特許文献17、特許文献3参照)。また、レンギョウのピノレジノールラーシレジノール還元酵素の遺伝子 (非特許文献18、特許文献3)、*Thuja plicata* のピノレジノールラーシレジノール還元酵素の遺伝子 (非特許文献19) についても報告がなされている。組換えセコイソラーシレジノールデヒドロゲナーゼ、およびその使用方法についても報告がなされている (特許文献4、非特許文献20)。

【特許文献1】特開2001-139579公報 (公開日: 2001年5月22日)

【特許文献2】特開平10-7676号公報 (公開日: 平成10 (1998) 年1月13日)

【特許文献3】特表2001-507931公報 (公表日: 2001年6月19日)

【特許文献4】特表2002-512790公報 (公表日: 2002年5月8日)

【非特許文献1】並木満夫著 「ゴマ その科学と機能性」 丸善プラネット社出版

【非特許文献2】日本農芸化学会誌 76 805-813 2002

【非特許文献3】Lignans: biosynthesis and function, Comprehensive natural products chemistry vol 1. 640-713, 1999

【非特許文献4】Phytochemistry, 49, 387, 1998

【非特許文献5】Phytochemistry, 30, 2953, 1991

【非特許文献6】Phytochemistry, 41, 457, 1996

【非特許文献7】Planta, 214, 288, 2001

【非特許文献8】J Biol Chem. 2003, May 5 [Epub ahead of print].

【非特許文献9】Nelson et al. Pharmacogenetics 6, 1-42, 1996

【非特許文献10】Nature 366 276-279, 1993

【非特許文献11】Plant J. 19, 441-451, 1999

【非特許文献12】FEBS Letters, 431, 287, 1998

【非特許文献13】Plant Physiology, 121, 821, 1999

【非特許文献14】Biochemical and Biophysical Research Communications, 251, 67, 1998

【非特許文献15】Plant and Cell Physiology, 40, 1182, 1999

【非特許文献16】J. Biol. Chem. 273; 7260, 1998

【非特許文献17】Plant Physiol. 123, 453, 2000

【非特許文献18】J. Biol. Chem. 271, 29473, 1996

【非特許文献19】J. Biol. Chem. 271, 618, 1999

【非特許文献20】J. Biol. Chem. 2001 Apr 20; 276(16):12614-23, Epub 2001 Jan 18.

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0019】

上述したように、セサミンは多様な生理活性を有することが明らかにされ、様々な改善効果をもつ物質である。しかしながら、現在のセサミンの生産方法は、上述したようなゴマ種子から得る方法しかない。従ってセサミンの生産はゴマ種子に依存し、セサミンの生産量の拡大と生産コストの削減には限界がある。

【0020】

つまり、上述したようなゴマ種子においてセサミンの生合成に関与することが明らかとなった2種のチトクロームP450について、これらをコードする遺伝子がクローニングされたり、酵素が精製されたことはない。また、上述したような他の生物種においてメチレンジオキシブリッジを形成するチトクロームP450についても、これをコードする遺伝子がクローニングされたり、酵素が精製されたことはない。また、上述したような他のチトクロームP450に関しても、これをコードする遺伝子がクローニングされたり、酵素が精製されたことはない。さらに、上述したようなクローニングされた他の生物種にお

けるリグナンの生合成酵素においても、セサミンやピペリトールの合成に関わるものではなかった。

【0021】

ゴマ種子由来の遺伝子についてもクローニングされたものがいくつかあり、例えば、種子の貯蔵タンパク質であるグロブリンとしてAF240004、AF240005、AF240006など、脂質の合成や貯蔵に関わる遺伝子としてはオレオシン (J Biochem. 122:819-24, 1997)、アシルキャリアータンパク質不飽和化酵素 (Plant Cell Physiol. 1996 37, 201-5)、ステロレオシン (Plant Physiol. 2002 128:1200-11)、脂肪酸不飽和化酵素 (Plant Sci. 161 935-941 (2001)) などがあるが、これらはリグナン合成に関わっている遺伝子ではない。

【0022】

したがって、リグナン合成に関与する酵素等をコードする遺伝子は、未だ明らかになっておらず、その同定が強く望まれていた。

【0023】

本発明は、上記の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、リグナン類の水酸基とメチル基からメチレンジオキシブリッジを形成する反応を触媒する酵素、好ましくはピノレジノールからピペリトールおよびピペリトールからセサミンへの反応を触媒する酵素の遺伝子を同定し、得られたゴマ由来チトクローム P 450 遺伝子を用いて、セサミン及びピペリトールを組換え生物などにより生産する方法などを実現することである。

【課題を解決するための手段】

【0024】

本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、ゴマ種子 cDNA ライブラリーからゴマ種子チトクローム P 450 遺伝子群 (以下、SiP 遺伝子) を取得し、酵母において発現させた。そして、その組換え酵母からミクロソーム画分を回収し、ピノレジノールまたはピペリトールと反応させ、それぞれからピペリトールまたはセサミンが生成されるかどうかを HPLC により分析を行った。その結果、ピノレジノールからピペリトール、およびピペリトールからセサミンへの二つの反応を触媒するタンパク質およびその遺伝子を同定することができ、本発明を完成させるに至った。

【0025】

すなわち、本発明は産業上有用な物質または方法として、下記 1) ~ 18) の発明を含むものである。

【0026】

1) ピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子 (ピノレジノールからピペリトールを、及び／又はピペリトールからセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子)。

【0027】

2) ピノレジノール及び／又はピペリトールに対してメチレンジオキシブリッジを形成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする、上記 1) に記載の遺伝子。

【0028】

3) 以下 (a) または (b) のタンパク質をコードする遺伝子。

(a) 配列番号 1 に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質。

(b) 上記アミノ酸配列において、1 個またはそれ以上のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び／又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質。

【0029】

4) 配列番号 1 に示されるアミノ酸配列に対して 50% 以上の相同性を有し、かつピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子。

【0030】

5) 配列番号 2 に示される塩基配列をオープンリーディングフレーム領域として有する遺伝子。

【0031】

6) 配列番号 2 に示される塩基配列、もしくは配列番号 1 に示されたアミノ酸配列をコードする塩基配列、またはそれら塩基配列の一部に対して、ストリンジェンシーな条件下で、ハイブリダイズし、ピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子。

【0032】

7) ゴマ由来である、上記 1) ～ 6) のいずれかに記載の遺伝子。

【0033】

8) 上記 1) ～ 7) のいずれかに記載の遺伝子によりコードされるタンパク質。

【0034】

9) 以下 (a) または (b) のタンパク質。

(a) 配列番号 1 に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質。

(b) 上記アミノ酸配列において、1 個またはそれ以上のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び／又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質。

【0035】

10) 上記 8) または 9) に記載のタンパク質を認識する抗体。

【0036】

11) 上記 1) ～ 7) のいずれかに記載の遺伝子を含有する組換え発現ベクター。

【0037】

12) 上記 1) ～ 7) のいずれかに記載の遺伝子を含有する組換え発現ベクターを含む形質転換体。

【0038】

13) 上記 12) に記載の形質転換体を培養し、又は生育させ、該形質転換体からピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質を採取する工程を含むタンパク質の生産方法。

【0039】

14) 上記 1) ～ 7) のいずれかに記載の遺伝子が導入された植物もしくはこれと同じ性質を有する該植物の子孫またはそれらの組織。

【0040】

15) 上記 1) ～ 7) のいずれかに記載の遺伝子、あるいは 8) または 9) に記載のタンパク質を用いてピペリトールまたはセサミンを生合成する工程を有する、ピペリトールまたはセサミンの生産方法。

【0041】

16) 上記 1) ～ 7) のいずれかに記載の遺伝子を用いることにより、リグナン高含有の形質転換体を生産する方法。

【0042】

17) 上記 1) ～ 7) のいずれかに記載の遺伝子を用いることにより、ピペリトール・セサミン高含有の植物体を生産する方法。

【0043】

18) 上記 1) ～ 7) のいずれかに記載の遺伝子を用いることにより、リグナン低含有の形質転換体を生産する方法。

【0044】

19) 上記 1) ～ 7) のいずれかに記載の遺伝子を用いることにより、ピペリトール・セサミン低含有の植物体を生産する方法。

【0045】

20) 上記 1) ～ 7) のいずれかに記載の遺伝子を用いて、ゴマを育種する方法。

【0046】

21) 上記1)～7)のいずれかに記載の遺伝子における少なくとも一部の塩基配列またはその相補配列をプローブとして用いた遺伝子検出器具。

【発明の効果】

【0047】

セサミンは、多様な生理活性が明らかにされ、様々な改善効果をもつ物質であることが既に知られており、本発明によって、ピノレジノールからピペリトールを、またはピペリトールからセサミンを生合成する反応を触媒する酵素の遺伝子が同定されたことから、この同定されたゴマ由来チトクロームP450遺伝子(SiP遺伝子)を用いて、セサミン及びピペリトールを組換え生物などにより生産することを実現できるため、セサミンの生産量の拡大及び生産コストの削減という効果を奏する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0048】

本発明の実施の形態について以下に説明するが、本発明は以下の記載に限定されるものではない。

【0049】

(1) 本発明に係る遺伝子および該遺伝子がコードするタンパク質の構造

本発明に係る遺伝子は、ピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子である。ここでいう「ピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応」とは、ピノレジノールからピペリトールを、及び／又はピペリトールからセサミンを生合成する反応をいい、より詳細には、ピノレジノール及び／又はピペリトールに対してメチレンジオキシブリッジを形成する反応いう。本実施の形態では、本発明に係る遺伝子として、ゴマ種子由来のピペリトール及びセサミン生合成タンパク質をコードする遺伝子SiP189(配列番号2に示す塩基配列)を挙げて説明する。

。

【0050】

(1-1) 本発明に係る遺伝子

本発明の遺伝子としては、例えば配列番号1に示されるアミノ酸配列をコードするものが挙げられる。しかしながら、複数個のアミノ酸の付加、欠失および／または他のアミノ酸との置換によって修飾されたアミノ酸配列を有するタンパク質も、もとのタンパク質と同様の酵素活性を維持することが知られている。すなわち本発明には、ピペリトールおよびセサミン生合成活性を有しているタンパク質をコードする遺伝子である限り、(a) 配列番号1に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質をコードする遺伝子、(b) 上記アミノ酸配列において、1個またはそれ以上のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び／又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子も含まれる。このような遺伝子として、例えば、配列番号2に示される塩基配列をオープンリーディングフレーム(ORF)として有する遺伝子が挙げられる。なお、後述する実施例でも説明するが、本発明に係る遺伝子は、チトクロームP450タンパク質をコードする遺伝子とも換言できる。

【0051】

ここで、「1個又はそれ以上のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び／又は付加された」とは、部位特異的突然変異誘発法(Hashimoto-Gotoh, Gene 152, 271-275(1995)他)等の公知の変異タンパク質作製法により置換、欠失、挿入、及び／又は付加できる程度の数(好ましくは10個以下、より好ましくは7個以下、さらに好ましくは5個以下)のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び／又は付加されることを意味する。したがって、上記(b)のタンパク質をコードする遺伝子は、上記(a)のタンパク質の変異タンパク質をコードする遺伝子である。また、ここでいう「変異」は、主として公知の変異タンパク質作製法により人為的に導入された変異を意味するが、天然から単離精製された同様の変異タンパク質をコードする遺伝子であってもよい。

【0052】

なお、本発明にかかる遺伝子は、2本鎖DNAのみならず、それを構成するセンス鎖お

よびアンチセンス鎖といった各1本鎖DNAやRNAを包含する。アンチセンス鎖は、プローブとして又はアンチセンス薬剤として利用できる。DNAには、例えばクローニングや化学合成技術、又はそれらの組み合わせで得られるようなcDNAやゲノムDNAなどが含まれる。さらに、本発明にかかる遺伝子は、上記(a)又は(b)のアミノ酸をコードする配列以外に、非翻訳領域(UTR)の配列やベクター配列(発現ベクター配列を含む)などの配列を含むものであってもよい。

【0053】

また本発明に係る遺伝子には、配列番号1に示されるアミノ酸配列に対して、20%以上、好ましくは50%以上、さらに好ましくは60%または70%以上の相同性を有するタンパク質であって、かつピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子も含まれ、かかる遺伝子もリグナン量制御および植物育種への利用することができる。なおここで「相同性」とは、アミノ酸配列中に占める同じ配列の割合であり、この値が高いほど両者は近縁であるといえる。

【0054】

また、本発明に係る遺伝子には、配列番号1に記載の塩基配列もしくはそこに記載のアミノ酸配列をコードする塩基配列、またはそれらの塩基配列の一部分、例えばコンセンサス領域の6個以上のアミノ酸をコードする塩基配列に対して、ストリンジエンシーな条件下で、ハイブリダイズし、かつピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードする遺伝子も含まれる。なお、上記「ストリンジエンシーな条件」とは、少なくとも80%の同一性、好ましくは少なくとも95%の同一性、最も好ましくは少なくとも97%の同一性が配列間に存在するときのみハイブリダイゼーションが起こることを意味する。具体的には、例えば、5×SSC、50℃の条件下でハイブリダイズして得られるという条件を挙げることができる。

【0055】

上記ハイブリダイゼーションは、J.Sambrook et al. Molecular Cloning, A Laboratory Manual, 2d Ed., Cold Spring Harbor Laboratory (1989)に記載されている方法等、従来公知の方法で行うことができる。通常、温度が高いほど、塩濃度が低いほどストリンジエンシーは高くなる(ハイブリダイズし難くなる)。なお、適切なハイブリダイゼーション温度は塩基配列やその塩基配列の長さによって異なり、例えばアミノ酸6個をコードする18塩基からなるDNAフラグメントをプローブとした場合には50℃以下の温度が好ましい。

【0056】

このようなハイブリダイゼーションによって選択される遺伝子としては、天然由来のもの、例えば植物由来のもの、例えば、コケ科植物由来の遺伝子が挙げられるが、植物以外の由来であってよい。また、ハイブリダイゼーションによって選択される遺伝子はcDNAであってよく、ゲノムDNAであってよい。

【0057】

(1-2) 本発明に係るタンパク質

本発明に係るタンパク質は、上記(1-1)欄で説明した遺伝子にコードされるタンパク質であればよい。このようなタンパク質であれば、ピノレジノールからピペリトールを、またはピペリトールからセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有する。なお、本発明には、ピノレジノールまたはピペリトールに対してメチレンジオキシブリッジを形成する反応を触媒する活性を有するタンパク質も含まれる。かかるタンパク質として、例えば、上述の(a)配列番号1に示されるアミノ酸配列を有するタンパク質、または(b)上記アミノ酸配列において、1個またはそれ以上のアミノ酸が置換、欠失、挿入、及び／又は付加されたアミノ酸配列からなり、かつピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質を挙げることができる。

【0058】

本発明に係るタンパク質は、上記(1-1)欄で説明した遺伝子を宿主細胞に導入して、そのタンパク質を細胞内発現させた状態であってよいし、細胞、組織などから単離精

製された状態であってもよい。また、上記宿主細胞での発現条件によっては、本発明にかかるタンパク質は、他のタンパク質とつながった融合タンパク質であってもよい。さらに本発明にかかるタンパク質は、化学合成されたものであってもよい。

なお、本発明に係るタンパク質は、アミノ酸がペプチド結合してなるポリペプチドであればよいが、これに限定されるものではなく、ポリペプチド以外の構造を含む複合タンパク質であってもよく、付加的なポリペプチドを含むものであってもよい。ポリペプチドが付加される場合としては、例えば、HisやMyc、Flag等によって本発明に係るタンパク質がエピトープ標識されるような場合が挙げられる。

【0059】

(2) 本発明に係る遺伝子およびタンパク質の取得方法

本発明に係る遺伝子およびタンパク質の取得方法（生産方法）は特に限定されるものではないが、代表的な方法として次に示す各方法を挙げることができる。

【0060】

(2-1) 遺伝子の取得方法

本発明に係る遺伝子の取得方法は、生来の塩基配列を有する遺伝子については、後述する実施例に具体的に示すように、例えばcDNAライブラリーのスクリーニングによって得られる。

【0061】

また、本発明にかかる遺伝子を取得する方法として、PCR等の増幅手段を用いる方法を挙げることができる。例えば、本発明にかかる遺伝子のcDNA配列のうち、5'側および3'側の配列（またはその相補配列）の中からそれぞれプライマーを調製し、これらプライマーを用いてゲノムDNA（またはcDNA）等を鋳型にしてPCR等を行い、両プライマー間に挟まれるDNA領域を増幅することで、本発明にかかる遺伝子を含むDNA断片を大量に取得できる。

【0062】

また遺伝子配列情報をもとにして、該配列を持つポリヌクレオチドを、公知の化学合成を用いて合成してもよい。

【0063】

修飾されたアミノ酸配列を有する酵素をコードするDNAについては、生来の塩基配列を有するDNAを基礎として、常用の部位特定変異誘発やPCR法を用いて合成することができる。例えば、修飾を導入したいDNA断片を生来のcDNAまたはゲノムDNAの制限酵素処理によって得て、これを鋳型にして、所望の変異を導入したプライマーを用いて部位特異的変異誘発またはPCR法を実施し、所望の修飾を導入したDNA断片を得る。その後、この変異を導入したDNA断片を目的とする酵素の他の部分をコードするDNA断片と連結すればよい。あるいはまた、短縮されたアミノ酸配列からなる酵素をコードするDNAを得るには、例えば目的とするアミノ酸配列より長いアミノ酸配列、例えば全長アミノ酸配列をコードするDNAを所望の制限酵素により切断し、その結果得られたDNA断片が目的とするアミノ酸配列の全体をコードしていない場合は、不足部分の配列からなるDNA断片を合成し、連結すればよい。

【0064】

また、得られた遺伝子は大腸菌または酵母での遺伝子発現系を用いて発現させ、酵素活性を測定することにより、得られた遺伝子がピノレジノールからピペリトールを、またはピペリトールからセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質をコードすることを確認することができる。さらに、当該遺伝子が発現させることにより、遺伝子産物であるピノレジノールからピペリトールを、またはピペリトールからセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質を得ることができる。

【0065】

あるいはまた、配列番号1に記載のアミノ酸配列に対する抗体を用いて他の生物のピペリトールおよびセサミン合成酵素遺伝子をクローン化することもできる。

【0066】

(2-2) タンパク質の取得方法

本発明に係るタンパク質を取得する方法(生産方法)は、特に限定されるものではないが、まず、本発明に係るタンパク質を発現する細胞、組織などから単純精製する方法を挙げることができる。なお、本発明に係るタンパク質を発現する細胞、組織は、自然発生型のものでもかまわないし、例えば、組み換えバキュロウイルスに感染した細胞、組織であってもかまわない。精製方法も特に限定されるものではなく、上述したように本発明にかかる遺伝子を含む発現ベクターによって形質転換された宿主を培養、栽培または飼育し、培養物から常法に従って、例えば濾過、遠心分離、細胞の破碎、ゲル濾過クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー等により目的とするタンパク質を回収、精製すればよい。

【0067】

また、本発明に係るタンパク質を取得する方法として、遺伝子組み換え技術等を用いる方法も挙げられる。この場合、例えば、本発明に係る遺伝子をベクターなどに組み込んだ後、公知の方法により、発現可能に宿主細胞に導入し、細胞内で翻訳されて得られる上記タンパク質を精製するという方法などを採用することができる。遺伝子の導入(形質転換)や遺伝子の発現等の具体的な方法については後述する。

【0068】

あるいはまた、配列番号1に記載のアミノ酸配列に対する抗体を用いても、ピペリトールおよびセサミン合成酵素のタンパク質を得ることができる。さらに抗体を用いて、他の生物のピペリトール及びセサミン合成酵素および当該酵素をコードする遺伝子をクローニングすることもできる。

【0069】

なお、このように宿主に外来遺伝子を導入する場合、外来遺伝子の発現のため宿主内で機能するプロモーターを組み入れた発現ベクター及び宿主には様々なものが存在するので、目的に応じたものを選択すればよい。産生されたタンパク質を精製する方法は、用いた宿主、タンパク質の性質によって異なるが、タグの利用等によって比較的容易に目的のタンパク質を精製することが可能である。

【0070】

変異タンパク質を作製する方法についても、特に限定されるものではない。例えば、部位特異的突然変異誘発法(Hashimoto-Gotoh, Gene 152, 271-275(1995)他)、PCR法を利用して塩基配列に点変異を導入し変異タンパク質を作製する方法、あるいはトランスポゾンの挿入による突然変異株作製法などの周知の変異タンパク質作製法を用いることができる。これら方法を用いることによって、上記(a)のタンパク質をコードするcDNAの塩基配列において、1またはそれ以上の塩基が置換、欠失、挿入、及び/又は付加されるように改変を加えることによって作製することができる。また、変異タンパク質の作製には、市販のキットを利用してもよい。

【0071】

また、本発明に係るタンパク質の取得方法は、上述に限定されることなく、例えば、市販されているペプチド合成器等を用いて化学合成されたものであってもよい。またその他の例としては、無細胞系のタンパク質合成液(Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 78, 5598-5602(1981)、J. Biol. Chem., 253, 3753-3756(1978)など)を利用して、本発明にかかる遺伝子から本発明にかかるタンパク質を合成してもよい。

(3) 本発明に係る抗体

本発明にかかる抗体は、上記(1-2)欄で説明したタンパク質、例えば、上記(a)又は(b)のタンパク質、またはその部分タンパク質、あるいは部分ペプチドを抗原として、公知の方法によりポリクローナル抗体またはモノクローナル抗体として得られる抗体である。公知の方法としては、例えば、文献(Harlowらの「Antibodies: A laboratory manual(Cold Spring Harbor Laboratory, New York(1988))」、岩崎らの「単クローン抗体

ハイブリドーマと E L I S A、講談社(1991)」」に記載の方法が挙げられる。このようにして得られる抗体は、本発明にかかるタンパク質の検出・測定などに利用できる。

【0072】

(4) 本発明に係る組換えベクター

本発明にかかる組換え発現ベクターは、上記(1-1)欄で説明した遺伝子、例えば、上記(a)又は(b)のタンパク質をコードする本発明の遺伝子を含むものである。例えば、cDNAが挿入された組換え発現ベクターが挙げられる。組換え発現ベクターの作製には、プラスミド、ファージ、又はコスミドなどを用いることができるが特に限定されるものではない。また、作製方法も公知の方法を用いて行えばよい。

【0073】

ベクターの具体的な種類は特に限定されるものではなく、宿主細胞(宿主細胞)中で発現可能なベクターを適宜選択すればよい。すなわち、宿主細胞の種類に応じて、確実に遺伝子を発現させるために適宜プロモーター配列を選択し、これと本発明にかかる遺伝子を各種プラスミド等に組み込んだものを発現ベクターとして用いればよい。

【0074】

本発明にかかる遺伝子が宿主細胞に導入されたか否か、さらには宿主細胞中で確実に発現しているか否かを確認するために、各種マーカーを用いてもよい。例えば、宿主細胞中で欠失している遺伝子をマーカーとして用い、このマーカーと本発明にかかる遺伝子とを含むプラスミド等を発現ベクターとして宿主細胞に導入する。これによってマーカー遺伝子の発現から本発明にかかる遺伝子の導入を確認することができる。あるいは、本発明にかかるタンパク質を融合タンパク質として発現させてもよく、例えば、オワンクラゲ由来の緑色蛍光タンパク質 GFP (Green Fluorescent Protein) をマーカーとして用い、本発明にかかるタンパク質を GFP 融合タンパク質として発現させてもよい。

【0075】

上記宿主細胞は、特に限定されるものではなく、従来公知の各種細胞を好適に用いることができる。具体的には、原核生物としては細菌、例えばエシェリヒア (*Escherichia*) 属に属する細菌、例えば大腸菌 (*Escherichia coli*)、バチルス (*Bacillus*) 属微生物、例えばバチルス・スブチルス (*Bacillus subtilis*) など常用の宿主を用いることができる。真核性宿主としては、下等真核生物、例えば真核性微生物、例えば真菌である酵母または糸状菌が使用できる。酵母としては例えばサッカロミセス (*Saccharomyces*) 属微生物、例えばサッカロミセス・セレビシエ (*Saccharomyces cerevisiae*) 等が挙げられ、また糸状菌としてはアスペルギルス (*Aspergillus*) 属微生物、例えばアスペルギルス・オリゼ (*Aspergillus oryzae*)、アスペルギルス・ニガー (*Aspergillus niger*)、ペニシリウム (*Penicillium*) 属微生物が挙げられる。さらに動物細胞または植物細胞が使用でき、植物細胞としては、ゴマ科植物、イネ科植物など種々の植物細胞が利用可能であり、また動物細胞としては、マウス、ハムスター、サル、ヒト等の細胞系が使用される。さらに昆虫細胞、例えばカイコ細胞、またはカイコの成虫それ自体も使用される。

【0076】

本発明の組換え発現ベクター、それらを導入すべき宿主の種類に依存して発現制御領域、例えばプロモーターおよびターミネーター、複製起点等を含有する。細菌用発現ベクターのプロモーターとしては、常用のプロモーター、例えば trc プロモーター、tac プロモーター、lac プロモーター等が使用され、酵母用プロモーターとしては、例えばグリセルアルデヒド 3 リン酸デヒドロゲナーゼ (GAPDH) プロモーター、PH05 プロモーター等が使用され、糸状菌用プロモーターとしては例えばアミラーゼ、trpC 等が使用される。また動物細胞宿主用プロモーターとしてはウイルス性プロモーター、例えば SV40 アーリープロモーター、SV40 レートプロモーター等が使用される。発現ベクターの作製は制限酵素、リガーゼ等を用いて常用に従って行うことができる。また、発現ベクターによる宿主の形質転換も常法に従って行うことができる。

【0077】

上記発現ベクターを宿主細胞に導入する方法、すなわち形質転換方法も特に限定され

るものではなく、電気穿孔法、リン酸カルシウム法、リポソーム法、DEAEデキストラン法、マイクロインジェクション法等の従来公知の方法を好適に用いることができる。

【0078】

(5) 本発明にかかる形質転換体

本発明にかかる形質転換体は、上記(1-1)欄で説明した本発明にかかる遺伝子、例えば、上記(a)又は(b)のタンパク質をコードする遺伝子が導入された形質転換体である。ここで、「遺伝子が導入された」とは、公知の遺伝子工学的手法(遺伝子操作技術)により、対象細胞(宿主細胞)内に発現可能に導入されることを意味する。また、上記「形質転換体」とは、細胞・組織・器官のみならず、生物個体を含む意味である。

【0079】

本発明にかかる形質転換体の作製方法(生産方法)は、上述の(4)欄で説明した組換え発現ベクターを形質転換する方法を挙げることができる。また、形質転換の対象となる生物も特に限定されるものではなく、上記宿主細胞で例示した各種微生物や植物を挙げることができる。また、プロモーターやベクターを選択すれば、動物、昆虫も形質転換の対象とすることが可能である。

【0080】

また、ここでいう形質転換体には、本発明に係る遺伝子が導入された植物もしくはこれと同じ性質を有する該植物の子孫またはそれらの組織も含まれる。

【0081】

(6) 本発明にかかる遺伝子検出器具

本発明にかかる遺伝子検出器具は、本発明にかかる遺伝子における少なくとも一部の塩基配列またはその相補配列をプローブとして用いたものである。遺伝子検出器具は、種々の条件下において、本発明にかかる遺伝子の発現パターンの検出・測定などに利用することができる。

【0082】

本発明にかかる遺伝子検出器具としては、例えば、本発明の遺伝子と特異的にハイブリダイズする上記プローブを基盤(担体)上に固定化したDNAチップが挙げられる。ここで「DNAチップ」とは、主として、合成したオリゴヌクレオチドをプローブに用いる合成型DNAチップを意味するが、PCR産物などのcDNAをプローブに用いる貼り付け型DNAマイクロアレイをも包含するものとする。

【0083】

プローブとして用いる配列は、cDNA配列の中から特徴的な配列を特定する従来公知の方法によって決定することができる。具体的には、例えば、SAGE: Serial Analysis of Gene Expression法(Science 276:1268, 1997; Cell 88:243, 1997; Science 270:484, 1995; Nature 389:300, 1997; 米国特許第5,695,937号)等を挙げることができる。

【0084】

なお、DNAチップの製造には、公知の方法を採用すればよい。例えば、オリゴヌクレオチドとして合成オリゴヌクレオチドを使用する場合には、フォトリソグラフィ技術と固相法DNA合成技術との組み合わせにより、基盤上で該オリゴヌクレオチドを合成すればよい。一方、オリゴヌクレオチドとしてcDNAを用いる場合には、アレイ機を用いて基盤上に貼り付ければよい。

【0085】

また、一般的なDNAチップと同様、パーフェクトマッチプローブ(オリゴヌクレオチド)と、該パーフェクトマッチプローブにおいて一塩基置換されたミスマッチプローブとを配置して遺伝子の検出精度をより向上させてもよい。さらに、異なる遺伝子を並行して検出するために、複数種のオリゴヌクレオチドを同一の基盤上に固定してDNAチップを構成してもよい。

【0086】

(7) 本発明にかかる遺伝子およびタンパク質等の利用方法(有用性)

ここまでは主にゴマのピペリトールおよびセサミン生合成酵素について述べてきたが、

本発明はゴマ由来遺伝子のみに限定されるものではなく、ピペリトールおよびセサミン生合成酵素の利用に関するものである。ピペリトールおよびセサミン生合成酵素の起源としては、植物でも動物でも微生物であってもよく、ピペリトールおよびセサミン生合成酵素活性を有していれば同様にリグナン量制御へ利用できる。さらに本発明はピペリトールおよびセサミン生合成酵素遺伝子を導入することにより、リグナン量が調節された植物もしくはその子孫又はこれらの組織に関するものであり、その形態は切り花であってもよい。本発明で得たピペリトールおよびセサミン生合成酵素遺伝子を用いると、ピペリトールまたはセサミンを生成したり、ピペリトールまたはセサミン生成を抑制したりできる。現在の技術水準をもってすれば、植物に遺伝子を導入し、その遺伝子を構成的あるいは組織特異的に発現させることは可能であるし、またアンチセンス法、コサプレッション法および RNAi 法などによって目的の遺伝子の発現を抑制することも可能である。形質転換可能な植物の例としては、ゴマ、イネ、レンギョウ、タバコ、シロイヌナズナ、ミヤコグサ、オオムギ、小麦、ナタネ、ポテト、トマト、ポプラ、バナナ、ユーカリ、サツマイモ、ダイズ、アルファルファ、ルーピン、トウモロコシ、カリフラワー、バラ、キク、カーネーション、金魚草、シクラメン、ラン、トルコギキョウ、フリージア、ガーベラ、グラジオラス、カスミソウ、カランコエ、ユリ、ペラルゴニウム、ゼラニウム、ペチュニア、トレニア、チューリップ、などがあげられるがこれらに限定されるものではない。

【0087】

また、上記(5)に記載の形質転換体を培養し、又は生育させ、該形質転換体からピペリトール及び／又はセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質を採取する工程を含むタンパク質の生産方法として利用することができる。上記の方法によれば、ピペリトールまたはセサミンを生合成する反応を触媒する活性を有するタンパク質を簡便かつ大量に生産することができる。なお、本方法は、上記の工程を含んでいればよく、その他具体的な条件、例えば、宿主の種類、使用する材料、条件などは特に限定されるものではなく、適宜設定可能である。

【0088】

また、本発明に係る遺伝子または本発明に係るタンパク質は、ピペリトールまたはセサミンを生合成する、ピペリトールまたはセサミンの生産方法にも利用することができる。上記の方法によれば、ピペリトールまたはセサミンを簡便かつ大量に生産することができる、ピペリトールまたはセサミンを含有する食品、特に健康食品、または医薬品などの製造に利用することができる。なお、「遺伝子またはタンパク質を用いて」とは、*in vivo*、*in vitro*、*ex vivo*など種々の条件で遺伝子またはタンパク質を用いる場合が含まれる。例えば、上記遺伝子を植物細胞に導入し、当該形質転換植物の生体内でピペリトールまたはセサミンを生合成させる場合や、生体外において本発明に係るタンパク質とピペリトールまたはセサミンの前駆体とを反応させて、ピペリトールまたはセサミンを生合成する場合、またはバイオリアクターなどを用いてピペリトールまたはセサミンを生産する場合などが挙げられる。なお、遺伝子はそのまま使用しても生合成酵素活性を有しないため、一旦、当該遺伝子がコードするタンパク質を発現させて使用することが好ましい。

【0089】

また、本発明に係る遺伝子を用いることにより、リグナン高含有の形質転換体、あるいはリグナン低含有の形質転換体を生産する方法も本発明に含まれる。これによれば、簡便かつ容易にリグナンの含有量を調節した形質転換体を生産でき、形質転換体からリグナンを取り出したり、または形質転換体そのままを食品、医薬品、またはこれらの前駆物質などとして利用することができる。

【0090】

また、本発明に係る遺伝子は、ゴマを育種する方法にも利用可能である。この方法によれば、例えば、本発明に係る遺伝子を導入して、多くのピペリトールまたはセサミンを含有するゴマを育種することができる。したがって、かかる形質転換ゴマの種子から、ピペリトールまたはセサミンを多く含む脂質を採取することができる。

【0091】

以下添付した図面に沿って実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能であることはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。

【実施例】

【0092】

以下実施例に従って、発明の詳細を述べる。分子生物学的手法はとくに断らない限り、Molecular Cloning (Sambrook) に依った。

【0093】

【実施例1：レンギョウからリグナンの調整】

レンギョウ乾燥葉 60 g を 3 L の水に浸して 30 分間煮沸し、抽出液をろ紙(circle; 300mm 東京ろし会社)にてろ過した。ろ過液を小分けし、エバポレーターで溶媒の体積を減らした後に凍結乾燥 (30/N) し、最終的に熱水抽出凍結乾燥物 (21.6837 g) を得た。

【0094】

上記熱水抽出凍結乾燥物 7 g を 100 ml の水に再溶解させ、超音破碎により均一化した。ダイアイオン HP-20 樹脂 (三菱化学) を 400 ml 充填したカラムを 50 % アセトン 800 ml で洗浄後、2 L の水で平衡化した。上記均一化したサンプルを、このカラムを用いて粗精製した。具体的には、カラムに上記サンプルを負荷した後、800 ml の水で洗浄し、次に 50 % メタノール 800 ml で一次溶出、引き続き 100 % メタノール 800 ml で二次溶出した。

【0095】

上記一次および二次溶出サンプルを以下の条件で HPLC 解析を行い、リグナン類の存在を確認した。移動相は、A 液: 0.1 % トリフルオロ酢酸 (TFA) を 0.1 % 含む H₂O、B 液: 0.1 % TFA、90 % アセトニトリル、カラムは C-30 (野村化学 C30-UG-5、4.6 mm × 150 mm) を用いた。A 60 %、B 40 % の混合液で 20 分間カラムを平衡化した後、15 分間にわたる流速 0.6 ml/分、A 60 %、B 40 % → A 10 %、B 90 % の直線濃度勾配で溶出し、A 10 %、B 90 % で 10 分間溶出した。検出は 287 nm の吸収を測定することにより行った (粗分取分析)。SPD-10A V (島津製作所) により、220 nm から 400 nm までスペクトルを測定し、その分析結果からリグナン特有の 2 つの吸収極大 (220 nm 及び 280 nm) を持つ物質を探索した。その結果、リグナンと思われる吸収極大を持つ物質は、主に二次溶出液内に保持されていることが明らかとなった。

【0096】

次に本分取として、リグナン類を分離するために以下の条件で分取を行った。二次溶出液をエバポレーターで濃縮後、凍結乾燥した (乾燥重量 1.0325 g)。凍結乾燥抽出物 1 g は、1 ml のジメチルスルフォキシド (DMSO) に溶解させて超音波破碎後、6 ml の B 30 % 溶液に溶かし、再度超音波破碎し、1,500 rpm で遠心分離後、その上清約 6 ml をサンプルとした。移動相は、A 液: 0.05 % TFA、B 液: 0.05 % TFA、90 % アセトニトリルとした。カラムは Develosil (ODS-UG-15/30; C-18、野村化学) を用いて、流速 3.2 ml/分、A 70 %、B 30 % で 20 分平衡化後にサンプルを負荷し、A 70 %、B 30 % から A 10 %、B 90 % の直線濃度勾配で 60 分間溶出後、A 10 %、B 90 % で 30 分間溶出を継続した。検出は 280 nm の波長で行い、1 分ごとに溶出液を分取した (3.2 ml) (検出器: 115 UV detector, Gilson 社)。最終的に 280 nm に吸収を持つピークを 8 種得た。得られた 8 種についてはエバポレーターで濃縮し、凍結乾燥後、上記粗分取分析と同様に上記粗分取分析と同様の HPLC 条件で分析し、リグナン特有のスペクトルを示す画分をさらに解析した。単一のリグナンと思われるフラクションに関しては NMR 解析を行い、ピノレジノールを同定した。

【0097】

〔実施例2: ゴマ種子のリグナン分析〕

栽培されているゴマのさやから未熟なゴマ種子を回収して凍結乾燥し、アセトンによりリグナン成分を抽出した。アセトン抽出液の調整方法については以下の通りである。

【0098】

ゴマ種子の凍結乾燥物を粉砕し、そのうち約100mgを1mlのアセトンに溶解し、アセトン抽出液を得た。該アセトン抽出液100 μ lを乾燥させたのち、20 μ l DM SOに再度溶解し、80 μ lの0.1% TFAを含む50%アセトニトリルを加えた。次にその溶液をMillex-LHフィルター(ミリポア社、0.45 μ m/4mm)にて精製し、HPLC分析用のサンプルとした。上記サンプルのHPLC分析を行った結果、標品のゴマリグナンであるピペリトール(保持時間13分)、セサミン(保持時間17分)およびセサモリン(保持時間19分)と保持時間の一致するリグナンの存在を確認した。

【0099】

さらにゴマ種子を若い順に成長段階に沿って4ステージに分けた。種子鞘が1.5cm以下のものをステージ1、1.5~2cmのものをステージ2、2cm以上で鞘色が黄緑色のものをステージ3、2cm以上で鞘色が濃緑色に変化しているものをステージ4とした。これらを上記のHPLC条件で同様に分析したところ、ピペリトール、セサミンおよびセサモリンはステージ3およびステージ4で蓄積が確認された。

【0100】

以上の結果から、HPLC分析に供したゴマ品種においてピペリトールおよびセサミンを生成する酵素および、それをコードする遺伝子が存在することが示された。

【0101】

〔実施例3: ゴマcDNAライブラリーの作製〕

上記のリグナン類を確認したゴマの種子5gからRNAを抽出し、オリゴテックス-MAG mRNA精製キット(TaKaRa)によりポリA(+)RNA 5 μ gを得た。このポリA(+)RNAを鋳型とし、ZAP Express cDNA Synthesis Kit and ZAP Express cDNA Gigapack3 Gold Cloning Kit(ストラタジーン社)を用いて、ストラタジーン社の推奨する方法によりcDNAライブラリーを作製した。作製したライブラリーは 1×10^7 pfu/mlであった。

【0102】

〔実施例4: ゴマ由来チトクロームP450遺伝子群のスクリーニング〕

上記cDNAライブラリー約30万pfuから、ゲノム配列が明らかとなっているシロイヌナズナのチトクロームP450遺伝子の配列をプローブとしてスクリーニングを行った。

【0103】

具体的には、シロイヌナズナチトクロームP450遺伝子群の一次配列を基に系統分類し(図3を参照)、CYP90A、CYP72B、CYP71B、CYP84A、CYP96A、CYP710A、CYP86A、CYP74、CYP75B、CYP79F、CYP81D、CYP705A、CYP83Aからなる13種のシロイヌナズナチトクロームP450遺伝子をゴマ種子ライブラリーのスクリーニングプローブとして用いた。配列番号5~30のプライマーを用いてプローブ増幅を行い、プローブのDIG標識を導入した。PCR反応条件は以下のとおりである。各植物種由来組織からRNeasy Plant Mini Kit(キアゲン社)を用いてtotal RNAを抽出した後、total RNA 1 μ gを鋳型として逆転写反応を行い、cDNAを得た。cDNA合成はSuperScriptTM First-Strand Synthesis System for RT-PCR(GIBCO BRL)を利用し、合成条件は本システム製造業者が推奨する条件に倣った。PCR反応液(50 μ l)は、各cDNA 1 μ l、1 \times Taq buffer(TaKaRa)、0.2mM dNTPs、プライマー(配列番号5~30)各0.4pmol/ μ l、rTaq polymerase 2.5Uからなる。反応は、94 $^{\circ}$ Cで5分反応させた後、94 $^{\circ}$ Cで1分、53 $^{\circ}$ Cで1分、72 $^{\circ}$ Cで2分の反応を28サイクル行った。プローブのDIG標識を導入する際にも同PCR条件で行った。スクリーニングならびに陽性クローンの検出は、DIG-DNA標識検出キット(ベリンガー社)を用いた。

【0104】

同社が推奨する方法を基本とし、下記のような低ストリンジェントな条件で行った。すなわち、ハイブリダイゼーションバッファー (5×SSC、30%ホルムアミド、50mMリン酸ナトリウムバッファー (pH7.0)、1%SDS、2%ブロッキング試薬 (ペーリンガー社)、0.1%ラウロイルサルコシン、80g/mlサケ精子DNA) を用い、37℃で2時間プレハイブリダイゼーションを行った後、DIG標識したプローブを加え、さらに一晩保持した。メンブレンは1%SDSを含む5×SSC洗浄液中、58℃で1時間洗浄した。

【0105】

二次スクリーニング後、独立した96個の陽性クローンが得られた。引き続いて同社が推奨する方法で96個のファージをpBKC-MVプラスミド (ストラタジーン社) へ切り出し、インサート領域の5'末端の塩基配列をM13RVプライマーに決定したところ、46クローンがチトクロームP450様配列を有していた。インサート領域の全塩基配列を決定し、最終的にSiP168、SiP189、SiP236、SiP249、SiP288の独立した5種類のP450ホモログに分類された。次にゴマの葉および種子cDNAを鋳型にこれら5種のSiP遺伝子に特異的なプライマー (配列番号31~40) によりRT-PCRを行い、種子で発現することを確認した。なおRT-PCRは、PCR反応液 (25μl) は、各cDNA 1μl、1×Ex-Taq buffer (Takara)、0.2mM dNTPs、プライマー各0.2pmol/μl、Ex-Taq polymerase 1.25Uからなる。反応は、94℃で3分反応させた後、94℃で1分、53℃で1分、72℃で2分の反応を26サイクル行った。なお、発現量を比較するためにゴマ内部標準遺伝子としてRibosomal 18SRNAを採用した (プライマー: 配列番号3および4)。

【0106】

これら5種のSiP遺伝子のうち、SiP249 (pSPB2031) およびSiP288 (pSPB2034) についてはすべての翻訳領域を含むと考えられた (配列番号53~56)。pSPB2031についてはBamHIとXhoIで消化し得られたcDNAを含む約1.8kb DNA断片を、酵母発現ベクターpYE22m (Holton, T. A et al., Nature 366, 276-279, 1993) をBamHIとSalIで消化し得られた約8.3kbのDNA断片に連結し、pSPB2046を得た。酵母発現ベクターpYE22mのマルチクロニングサイトはglyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase遺伝子 (GAPDH) プロモーターとGAPDHターミネーターに挟まれており、ここに挿入されたインサートは酵母内においてGAPDHプロモーターの制御下で構成的に発現する。なお、選抜マーカーはトリプトファンである。一方、pSPB2034についてはBamHIとXhoIで消化し得られたcDNAを含む約1.8kb DNA断片を、酵母発現ベクターpYE22mをBamHIとSalIで消化し得られた約8.3kbのDNA断片に連結し、pSPB2047を得た。引き続き、これらを常法によりINVs株へ形質転換し、それぞれINVs/pYE22m/SiP249およびINVs/pYE22m/SiP288を得た。

【0107】

一方、SiP168、189、236についてはオープンリーディングフレームが不完全であったので、GeneRacerキット (インヴィトロジェン社) を用いて5'領域を製造業者の推奨する方法に従い増幅し、完全なオープンリーディングフレームを含む配列を得た (配列番号1~2、57~60)。増幅用プライマーは配列番号41~46を用いた。

【0108】

次に3種のSiP遺伝子の完全長オープンリーディングフレームをクローン化するために、以下の制限酵素サイトを付加したプライマーによりゴマ種子由来cDNAを鋳型にPCRにより増幅した。なおPCR条件は次のとおりである。PCR反応液 (50μl) は、鋳型ゴマ種子由来cDNA 1μl、1×KOD plus buffer (TOYOBO)、0.2mM dNTPs、プライマー (配列番号47~52) 各0.4pmol/μl、1mM M

g S O₄, KOD plus DNA polymerase 1 Uからなる。反応は、94℃で5分反応させた後、94℃で1分、55℃で1分、72℃で2分の反応を30サイクル行った。増幅された完全長 S i P を含む断片を p C R-blunt II TOP0ベクター（インヴィトロジェン社）のマルチクローニングサイトに挿入し、TOP0-SiP168(pSPB2064)、TOP0-SiP189(pSPB2055)、TOP0-SiP236(pSPB2048)を得た。

【0109】

pSPB2064、pSPB2055、pSPB2048を増幅したプライマーに付加した制限酵素サイトで消化して得られる約1.5 kbのcDNAを含むDNA断片と、pY E 2 2 mベクターをB a m H IとS a l Iで消化して得られるDNA断片約8.3 kbを連結することにより、pY E 2 2 m/S i P 1 6 8 (pSPB2052)、pY E 2 2 m/S i P 1 8 9 (pSPB2053)、pY E 2 2 m/S i P 2 3 6 (pSPB2049)を得た。

【0110】

引き続き、これら3種の酵母発現ベクターを酵母コンピテントセル（I N V s c株、インヴィトロジェン社）に形質転換し、I N V s c/pY E 2 2 m/S i P 1 6 8、I N V s c/pY E 2 2 m/S i P 1 8 9、I N V s c/pY E 2 2 m/S i P 2 3 6を得た。

【0111】

前述のI N V s c/pY E 2 2 m/S i P 2 4 9、I N V s c/pY E 2 2 m/S i P 2 8 8に加え、I N V s c/pY E 2 2 m/S i P 1 6 8、I N V s c/pY E 2 2 m/S i P 1 8 9、I N V s c/pY E 2 2 m/S i P 2 3 6を以下に組成示すY N B D g l c培地400 mL (0.67 % Yeast Nitrogen Base、2 % Glucose、20 mg/Lのトリプトファンを除く各種アミノ酸)で30℃、24時間培養し、引き続き、発現誘導の為Y N B D g a l培地400 mL (0.67 % Yeast Nitrogen Base、2 % Glactose、20 mg/Lのトリプトファンを除く各種アミノ酸)で30℃、24時間培養した。公知の方法 (Holton, T. A et al., Nature 366, 276-279. 1993)に従って形質転換酵母培養液から超遠心法でミクロソーム画分を回収した。

【0112】

ミクロソーム沈殿をサスペンション緩衝液 (0.1 Mリン酸カリウム緩衝液pH 7.4、20 %グリセロール、0.3 μl/mlメルカプトエタノール) 1 mlに懸濁し、ミクロソーム溶液を得た。ミクロソーム溶液240 μlに1 Mリン酸カリウム緩衝液 (pH 7.4)を30 μl、50 mM N A D P Hを6 μl、267 μMピペリトールまたはセサミンを24 μl加え、30℃で1時間保持した。反応液に等量の100 %アセトニトリルを加え、終濃度50 %アセトニトリル溶液とした。次に、この溶液を遠心 (15000 rpm、3分、4℃)し、その上清150 μlをMillex-LHフィルター (ミリポア社、0.45 μm/4 mm)にて精製し、上記粗分取分析と同様のHPLC条件で分析を行った。

【0113】

以下にI N V s c/pY E 2 2 m/S i P 1 8 9について行ったHPLC分析の結果を示す。図2 (a)ではピノレジノール (保持時間9分)であったものが、図2 (b)において示したようにI N V s c/pY E 2 2 m/S i P 1 8 9により、保持時間13分と17分の新たなリグナン様の吸収スペクトルを有する生成物が生じていることが示された。さらに図2 (d)でピペリトール (保持時間13分)であったものが、図2 (e)では上記I N V s c/pY E 2 2 m/S i P 1 8 9により保持時間17分の新たなリグナン様の吸収スペクトルを有する生成物が生じることがわかった。これらは保持時間からそれぞれピペリトール (保持時間13分)とセサミン (保持時間17分)であると考えられた。

【0114】

引き続き、LC-MS/MS分析 (LCはWaters 2790, ウォーターズ社、MSはQUATR 0 micro, マイクロマス社)により二つのピーク (保持時間13分と17分)の分子量とフラグメントパターンを比較したところ、分子量標準品と一致したため、S i P 1 8 9による二つの生成物はピペリトールおよびセサミンであることが証明された。LC-MS/MS解析条件は次の通りである。LC条件はDevelosil C30-UG-5 (野村化学、2.0×50 mm)を用い、移動相はA液をH₂O、B液をメタノール、C液を10 mM C H₃ C O

ONH₄とし、グラジエントは常時10% C液で、流速0.25 ml/min.で行った。この条件でピペリトールは8.4分、セサミンは10.1分に検出される。MS条件は測定モードPOSITIVEで行った。これにより、SiP189はピノレジノールからピペリトールを経てセサミンを合成する反応を触媒する酵素をコードすることが明らかになった。また、ピノレジノールからピペリトール、ピペリトールからセサミンを合成する反応は別の酵素が触媒するとされていたが、ここで得た遺伝子がコードする酵素は単一の酵素で両方の反応を触媒することがわかった。

【0115】

また、INVsc/pYE22m/SiP189のセサミン生成活性はNADPH依存であることがわかった(図2(b)・(c))。これはピペリトール生成活性についても同様であった(図2(e)・(f))。また、NADPH存在する場合と比べ、NADPHが存在しない場合ではピペリトール生成活性およびセサミン生成活性はそれぞれ約14%と約18%に減少した。

【0116】

次にINVsc/pYE22m/SiP189のミクロソーム画分を一酸化炭素により還元した後、吸収スペクトルを分光光度計(日立U-300P Spectrophotometer)で測定したところ、コントロール形質転換酵母であるINVsc/pYE22mと比較し、450 nmの吸収を示した。このことからINVsc/pYE22m/SiP189のミクロソーム画分内においてチトクロームP450タンパク質が生成されていることを確認した。

【0117】

実施例2で生長段階別に4ステージに分離したゴマ種子から、実施例2と同じ条件でRNAを抽出し、SiP189を増幅する配列番号45と46のプライマーセットおよびSi18SrRNAを増幅する配列番号3および4のプライマーセットによりRT-PCRを行った。PCR反応液(25 μl)は、各cDNA 1 μl、1×Ex-Taq buffer(TaKaRa)、0.2 mM dNTPs、プライマー各0.2 pmol/μl、Ex-Taq polymerase 1.25 Uからなる。反応は、94℃で3分反応させた後、94℃で1分、53℃で1分、72℃で2分の反応を26サイクル行った。その結果、ピペリトールおよびセサミンの蓄積が確認されたステージ3および4においてSiP189が強く発現することが確認された。生長段階に依存したリグナン蓄積と、その生成活性のあるSiP189の遺伝子発現時期が一致することから、ゴマ種子内でピペリトールおよびセサミンを生成する酵素遺伝子がSiP189であることが強く支持された。

【0118】

以上の結果から、SiP189遺伝子はピノレジノールからピペリトールおよびピペリトールからセサミンを生成する反応を触媒するチトクロームP450をコードすることが明らかとなった。図3の矢印に示したのはSiP189である。ここからSiP189はCYP81ファミリーに属していることがわかる。

【0119】

本遺伝子を利用することでゴマあるいは他の植物や生物を用いて、あるいはバイオリクターなどの系を用いてセサミンとピペリトールを合成することが可能になった。

【産業上の利用可能性】

【0120】

以上のように、本発明に係るゴマ種子由来のSiP189遺伝子はピノレジノールからピペリトールおよびピペリトールからセサミンを生成する反応を触媒するチトクロームP450をコードする遺伝子である。古来から貴重な食品であり、健康に良い食品の代表として知られているゴマの種子、または該種子から得た油、ゴマ種子からの抽出物は今後益々注目されると期待される。その中でもセサミンはその生理活性が注目されている。従って、本発明により同定されたSiP189遺伝子は、これまでゴマ種子から生産する方法しかなかったセサミンの生産手段に利用することが可能であり、生産量の拡大が大いに期待できる。

【0121】

したがって、本発明は、農業、食品産業、医薬品産業、およびこれらの関連産業に利用可能である。

【図面の簡単な説明】

【0122】

【図1】ゴマリグナンの一般的な合成経路を模式的に示す図である。

【図2】本発明に係る実施例における S i P 1 8 9 遺伝子がコードする酵素の活性を測定した H P L C の結果を示す図である。

【図3】(チトクローム P 4 5 0 のコードするアミノ酸の一次構造解析から得られる樹系図である。

【図4】本発明に係る S i P 1 8 9 遺伝子がコードするタンパク質との相同性検索の結果を示す図である。

【符号の説明】

【0123】

- 1 コニフェリルアルコール
- 2 ピノレジノール
- 3 ピペリトール合成酵素
- 4 ピペリトール
- 5 セサミン合成酵素
- 6 セサミン

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> SUNTORY LIMITED

<120> The gene related to the biosynthesis of lignan, and the use thereof

<130> p03-0087

<140>

<141>

<160> 60

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 506

<212> PRT

<213> Sesamum indicum

<400> 1

Met Glu Ala Glu Met Leu Tyr Ser Ala Leu Ala Leu Thr Phe Ala Ile
 1 5 10 15

Phe Met Val Tyr Arg Ile Leu Ser Asn Ser Gln Asp Lys Arg Ser Leu
 20 25 30

Thr Lys Leu Pro Pro Ser Pro Pro Gly Trp Leu Pro Val Ile Gly His
 35 40 45

Ala His Leu Met Lys Asn Leu Leu His Arg Thr Leu Tyr Asp Phe Ser
 50 55 60

Gln Lys Leu Gly Pro Ile Phe Ser Ile Arg Phe Gly Ser Arg Leu Val
 65 70 75 80

Val Val Val Ser Ser Ser Ser Leu Val Glu Glu Cys Phe Thr Lys Tyr
 85 90 95

Asp Ile Val Leu Ala Asn Arg Pro Gln Ala Ser Val Asp Arg Arg Ser
 100 105 110

Leu Gly Phe Ser Thr Thr Ser Val Ile Gly Ala Pro Tyr Gly Asp His
 115 120 125

Trp Arg Asn Leu Arg Lys Leu Cys Asp Leu Glu Val Phe Ala Pro Thr
 130 135 140

Arg Leu Ala Ser Phe Leu Ser Ile Arg Leu Asp Glu Arg Asp Arg Met
 145 150 155 160
 Ile Ser Ala Leu Tyr Lys Ile Ser Ser Ala Gly Phe Ala Lys Val Asn
 165 170 175
 Leu Glu Ala Lys Ile Val Glu Leu Thr Phe Asn Asn Ile Met Arg Met
 180 185 190
 Val Ala Ala Lys Arg Tyr Tyr Gly Glu Glu Ala Glu Asp Asp Glu Glu
 195 200 205
 Ala Lys Arg Phe Arg Asp Leu Thr Lys Glu Ala Leu Glu Leu Thr Ser
 210 215 220
 Ala Ser Asn Pro Gly Glu Ile Phe Pro Ile Leu Arg Trp Leu Gly Cys
 225 230 235 240
 Asn Gly Leu Glu Lys Lys Leu Ala Val His Ser Arg Lys Thr Asp Glu
 245 250 255
 Phe Met Gln Gly Leu Leu Asp Glu His Arg Arg Gly Glu Arg Gln Asn
 260 265 270
 Thr Met Val Asp His Leu Leu Ser Leu Gln Glu Ser Gln Pro Glu Tyr
 275 280 285
 Tyr Thr Asp Glu Ile Ile Thr Gly Leu Ile Val Ala Leu Ile Ile Ala
 290 295 300
 Gly Thr Asp Ala Ser Val Val Thr Thr Glu Trp Ala Met Ser Leu Leu
 305 310 315 320
 Leu Asn His Pro Lys Val Leu Glu Lys Ala Arg Lys Glu Leu Asp Thr
 325 330 335
 Leu Val Gly His Glu Arg Met Val Asp Glu His Asp Leu Pro Lys Leu
 340 345 350
 Arg Tyr Leu His Cys Ile Val Leu Glu Thr Leu Arg Leu Phe Pro Ser
 355 360 365
 Val Pro Thr Leu Val Pro His Glu Pro Ser Glu Asp Cys Lys Ile Gly
 370 375 380
 Gly Tyr Asn Val Pro Lys Gly Thr Met Val Leu Val Asn Ala Trp Ala
 385 390 395 400
 Ile His Arg Asp Pro Lys Val Trp Asp Asp Pro Leu Ser Phe Lys Pro
 405 410 415

Asp Arg Phe Glu Ile Met Glu Val Glu Thr His Lys Leu Leu Pro Phe
420 425 430

Gly Met Gly Arg Arg Ala Cys Pro Gly Ala Gly Leu Ala Gln Lys Phe
435 440 445

Val Gly Leu Ala Leu Gly Ser Leu Ile Gln Cys Phe Asp Trp Glu Arg
450 455 460

Thr Ser Pro Glu Lys Ile Asp Leu Asn Glu Gly Ser Gly Ile Thr Leu
465 470 475 480

Pro Lys Ala Lys Thr Leu Glu Ala Met Cys Lys Pro Arg His Val Met
485 490 495

Glu Lys Val Leu Arg Gln Val Ser Asn Val
500 505

<210> 2

<211> 1521

<212> DNA

<213> Sesamum indicum

<400> 2

```

atggaagctg aaatgctata ttcagctctc gctctcacct tcgccatatt catggtttac 60
agaattcttt ctaattcgca ggacaagcgc agcctgacta agctgcctcc gagcccgccc 120
ggttggtcgc cggatgatcg ccacgctcat ctcattgaaa atctcctcca tagaacacta 180
tacgacttct cccagaaact gggacccata ttttccatcc ggttcgggtc gcgcctcgtg 240
gtggtggtgt cctcctcctc cctggtggag gaatgtttca ccaagtatga cattgtcttg 300
gcaaatcgcc ctcaggcttc tgttgaccgg cgctcacttg ggttcagcac caccagcgta 360
atcggggccc cgtacgggga ccattggcgc aacctgcgaa agttgtgcga tcttgaagta 420
ttcgccccga cccgtctcgc ctcgttttta tccatcaggc ttgacgagag ggaccgcatg 480
atttccgctg tatacaaaat ctcgtccgcc ggtttcgcca aggtgaattt ggaagcgaag 540
attgtggagc tgacgtttta taacataatg aggatggtgg cggcgaagag atactatggg 600
gaggagcgcg aggacgacga ggaggcgaag aggttcaggg acctgacgaa ggaggctttg 660
gagttgacga gcgcttccaa tcctggtgag atatttccaa tattgcggtg gcttggttgc 720
aatgggctgg agaagaagct ggctgttcac tcgcggaaga cggatgagtt catgcaaggg 780
ctgctggacg aacaccgacg gggcgagcgc cagaacacca tggttgatca tttgctttcg 840
ttgcaggaat ctcaacctga gtactacact gatgaaatca tcaactggcct catagttgca 900
ttgataattg cgggaacgga tgcacgggtt gtaactacag aatgggcgat gtccctttta 960
ctaaatcatc ccaaagtact tgaaaaggct agaaaagaac tggacactct agtaggacac 1020
gaacgcatgg ttgatgaaca cgatctcccc aaactacgtt accttactg catagtcttg 1080
gagaccttaa ggttattccc ttctgttcca actttggtgc cacacgaacc atcagaggat 1140
tgtaaaattg ggggatacaa tgtccccaag gggacaatgg tattagttaa tgcttgggca 1200
atacaccgag accccaaggt gtgggacgac cccttgagct ttaagcccga caggtttgag 1260
ataatggaag tggagacaca caagttgttg ccgttcggaa tgggcaggag agcgtgtcct 1320
ggagctggac tggcgacaga gtttgtgggg ttggcttttg ggtcgctgat tcagtgtttc 1380
gactgggaga gaacgagtcc cgagaaaatt gacttgaacg aaggttcttg gataaccttg 1440

```

cctaaagcta agacgttgga agccatgtgc aaacctagac atgtcatgga aaaagttctt 1500
cgtcaggttt ccaacgtttg a 1521

<210> 3
<211> 21
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, Sil8SrRNA-FW

<400> 3
tatgcttgtc tcaaagatta a 21

<210> 4
<211> 21
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, Sil8SrRNA-RV

<400> 4
aacatctaag ggcatcacag a 21

<210> 5
<211> 24
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP90A-FW

<400> 5
ttttccgatg aagagattgt tgac 24

<210> 6
<211> 18
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially

Synthesized Primer Sequence, CYP90A-RV

<400> 6

tgccatctcc aagggttg

18

<210> 7

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP72B-FW

<400> 7

cttaatgttc aaatgataat ggat

24

<210> 8

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP72B-RV

<400> 8

gtaaactcgtt cagggttg

18

<210> 9

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP71B-FW

<400> 9

ttcaccactg atcatctcaa agga

24

<210> 10

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP71B-RV

<400> 10

agaaacctgt cagggtta

18

<210> 11

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP84A-FW

<400> 11

cttaccctg acaatatcaa agca

24

<210> 12

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP84A-RV

<400> 12

aaaaacctcg atggtcta

18

<210> 13

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP96A-FW

<400> 13

agtcatagata agttcctcag ggac

24

<210> 14

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP96A-RV

<400> 14

atccatctct ctggcttg

18

<210> 15

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP710A-FW

<400> 15

tccgaagacg aagccatcgg cggt

24

<210> 16

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP710A-RV

<400> 16

ctaaaccggt ccgcatcg

18

<210> 17

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP86A-FW

<400> 17

cgcgtggcgc tcaacttcat ccta

24

<210> 18

<211> 18
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP86A-RV

<400> 18
atccatctct ctggtttg 18

<210> 19
<211> 24
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP74-FW

<400> 19
cgagaagaag ctactcaca tctt 24

<210> 20
<211> 18
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP74-RV

<400> 20
acgaatctct ccggcaca 18

<210> 21
<211> 25
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP75B-FW

<400> 21
ttaacggata ctgagattaa agcct 25

<210> 22
<211> 18
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP75B-RV

<400> 22
aagaatctct cgggttta 18

<210> 23
<211> 24
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP79F-FW

<400> 23
gtcacaccag acgaaatcaa agct 24

<210> 24
<211> 18
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP79F-RV

<400> 24
aggtgacgct ccggtttg 18

<210> 25
<211> 24
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP81D-FW

<400> 25



tacatggacc gcatcatcaa agga

24

<210> 26

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP81D-RV

<400> 26

tcgaacctct ctggcttg

18

<210> 27

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP705A-FW

<400> 27

catatcaagt cgcttctcac ggta

24

<210> 28

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP705A-RV

<400> 28

agaaacctct ctggttta

18

<210> 29

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP83A-FW

<400> 29

tttactgatg ataatgtcaa agcc

24

<210> 30

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, CYP83A-RV

<400> 30

agaaacctct cgggccta

18

<210> 31

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP168-FW

<400> 31

tttcccttgt tctcctactc t

21

<210> 32

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP168-RV

<400> 32

aaataatgat agctaaattt t

21

<210> 33

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP189-FW

<400> 33

tcgtttttat ccatcaggct t

21

<210> 34

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP189-RV

<400> 34

caaacgttgg aaacctgacg a

21

<210> 35

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP236-FW

<400> 35

ggatgttctg tggaagttaa a

21

<210> 36

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP236-RV

<400> 36

atctaagttt catgcagttt t

21

<210> 37

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP249-FW

<400> 37

ctaagcttca aaatgtcgat a

21

<210> 38

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP249-RV

<400> 38

ccaacttact tattacagat a

21

<210> 39

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP288-FW

<400> 39

aaaatggtgg gaattgtgta t

21

<210> 40

<211> 19

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP288-RV


<400> 40

tacatctcaa tttttctta

19

<210> 41

<211> 32



<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, GR-SiP168-RV

<400> 41

cacgatcctg gagatttccg gggaggatac aa

32

<210> 42

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, GR-SiP168-Nest-RV

<400> 42

gtaggttttg gagagt

18

<210> 43

<211> 31

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, GR-SiP189-RV

<400> 43

ctcgtcgtcc tccgcctcct ccccatagta t

31

<210> 44

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, GR-SiP189-Nest-RV

<400> 44

accatcctca ttatgttatt a

21

<210> 45
<211> 28
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, GR-SiP236-RV

<400> 45
ccaggagaga gttgttgctg ttgtgtct 28

<210> 46
<211> 18
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, GR-SiP236-Nest-RV

<400> 46
tataaagctt attgttat 18

<210> 47
<211> 33
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP168-BamH1-FW

<400> 47
ggatccaaaa gagcaaatta tggatctact act 33

<210> 48
<211> 33
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP168-XhoI-RV

<400> 48
ctcgagaagg gaaaataatg atagctaaat ttt 33

<210> 49
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP189-BamH1-FW

<400> 49
ggatcctttt cagccaacat ggaagctgaa

30

<210> 50
<211> 33
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP189-Xho1-RV

<400> 50
ctcgagaaaa agagcatcat ttaatcatat act

33

<210> 51
<211> 35
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP236-BamH1-FW

<400> 51
ggatccttca cttcacttca ttgctcaatg gcaaa

35

<210> 52
<211> 33
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>
<223> Description of Artificial Sequence: Artificially
Synthesized Primer Sequence, SiP236-Xho1-RV

<400> 52

ctcgagaaca gctgagaccc cacagcaatc taa

33

<210> 53

<211> 1506

<212> DNA

<213> Sesamum indicum

<400> 53

```

atgtcgatac ctctccttat ctctctctca ttaatcatcc ttgttttctt actagtccga 60
cgacgccgca acagcccggc tggtcgaaaa ctccggcgtc ctccggggcc tcctggcctt 120
cccttctctg ggaacttgct ccaatacaac ccctccgata tccatctccg cctgacaaaa 180
ctctcagaaa agtacggccc gcttatgtac atgacgttcg tcggaaagcc cgtgggtgtg 240
atttcacgga cccgagtggc caaagaggct ttgaagtaca atgaccttgc attttcgagc 300
aggccttcta ccattgcatc gcgcaaagtg gcttacaaca acagtacatc ctccatgtca 360
ccgtacacag agtactggag agaactgcgg aaaaatggtcg ttcttcgcct ctttacggtc 420
aaacaagtga actctttccg ccctgctcga gaagaagaag tggcccgcac ggtgaaagag 480
atttcagac gggccaacgc gcatcagccc gttaacatta atgaaatagc gttgtcgttg 540
tcgagcagga tgatatctag gtttgcactg gggaagaggc acgacgagga gaacggggccg 600
gaaaagagga ggttcgacag gattctgcag ctgcttcagt tgggtgcggt ggaaattttc 660
tttggtgatt attctccatg gctgggctgg attgacagac tgtgtggtaa ggtttctcag 720
cttgagaagg cgttcaagga tttggattca ttgtatgaag agatgatcgc ggagcatctg 780
agcccgaata ggcccagagc tatgaacgga gacattcttg atatgcta attcagatgaaa 840
gaagatcggc cgtcgacggc tcaaattgat tgggatcata tcaagggcgt actcatgaac 900
atgttcgtag ccggaacaga cacaactgca gctacaataa catgggcaat gacagctctg 960
atcaagaagc ctcaagtact gaacaaagtg caacaagaaa tcagatctgt ggtcgggaaag 1020
aaaggcagcg tagccgaaga tgatatacaa aaacttcctt attttaagc ggtggtgaag 1080
gagactctga gactgtacgc accagctcca ctctcactgc ccagactgac aatcaaaaagc 1140
agcgtcatag atggatacga cattgaaccc aacaccatag tttacgtgaa cgtttgggagc 1200
attagccgag acaaggattt ttggggagaa ccggatgagt tcttgcccga aagattcttg 1260
aacagtagcg tggactttta aggccaagat ttcgggtttc ttccattcgg gtcggggcga 1320
agagtgtgcc ctggaatggc cttggggact gcagaagtgg aggtgtcgct tgctaataatt 1380
ctgtattgct tccactggga attgccgcct ggaatggtag aagatgacgt tgatatggac 1440
tttttgcctg gaattactac tcataagaaa aatgcactct atttgatggc caaaagctat 1500
ctgtaa
1506

```

<210> 54

<211> 501

<212> PRT

<213> Sesamum indicum

<400> 54

```

Met Ser Ile Pro Leu Leu Ile Ser Leu Ser Leu Ile Ile Leu Val Phe
  1             5             10             15

```

```

Leu Leu Val Arg Arg Arg Arg Asn Ser Pro Ala Gly Arg Lys Leu Arg
      20             25             30

```



Arg Pro Pro Gly Pro Pro Gly Leu Pro Phe Leu Gly Asn Leu Leu Gln
 35 40 45
 Tyr Asn Pro Ser Asp Leu His Leu Arg Leu Thr Lys Leu Ser Glu Lys
 50 55 60
 Tyr Gly Pro Leu Met Tyr Met Thr Phe Val Gly Lys Pro Val Val Val
 65 70 75 80
 Ile Ser Ser Ala Arg Val Ala Lys Glu Ala Leu Lys Tyr Asn Asp Leu
 85 90 95
 Ala Phe Ser Ser Arg Pro Ser Thr Ile Ala Ser Arg Lys Val Ala Tyr
 100 105 110
 Asn Asn Ser Asp Ile Ser Met Ser Pro Tyr Thr Glu Tyr Trp Arg Glu
 115 120 125
 Leu Arg Lys Met Val Val Leu Arg Leu Phe Thr Val Lys Gln Val Asn
 130 135 140
 Ser Phe Arg Pro Ala Arg Glu Glu Glu Val Ala Arg Met Val Lys Glu
 145 150 155 160
 Ile Ser Arg Arg Ala Asn Ala His Gln Pro Val Asn Ile Asn Glu Ile
 165 170 175
 Ala Leu Ser Leu Ser Ser Arg Met Ile Ser Arg Phe Ala Leu Gly Lys
 180 185 190
 Arg Tyr Asp Glu Glu Asn Gly Pro Glu Lys Arg Arg Phe Asp Arg Ile
 195 200 205
 Leu Gln Leu Leu Gln Leu Val Ser Val Glu Ile Phe Phe Gly Asp Tyr
 210 215 220
 Ser Pro Trp Leu Gly Trp Ile Asp Arg Leu Cys Gly Lys Val Ser Gln
 225 230 235 240
 Leu Glu Lys Ala Phe Lys Asp Leu Asp Ser Leu Tyr Glu Glu Met Ile
 245 250 255
 Ala Glu His Leu Ser Pro Asn Arg Pro Glu Ser Met Asn Gly Asp Ile
 260 265 270
 Leu Asp Met Leu Ile Gln Met Lys Glu Asp Arg Ser Ser Thr Val Gln
 275 280 285
 Ile Asp Trp Asp His Ile Lys Gly Val Leu Met Asn Met Phe Val Ala
 290 295 300

Gly Thr Asp Thr Thr Ala Ala Thr Ile Thr Trp Ala Met Thr Ala Leu
 305 310 315 320
 Ile Lys Lys Pro Gln Val Leu Asn Lys Val Gln Gln Glu Ile Arg Ser
 325 330 335
 Val Val Gly Lys Lys Gly Ser Val Ala Glu Asp Asp Ile Gln Lys Leu
 340 345 350
 Pro Tyr Phe Lys Ala Val Val Lys Glu Thr Leu Arg Leu Tyr Ala Pro
 355 360 365
 Ala Pro Leu Ser Leu Pro Arg Leu Thr Ile Lys Ser Ser Val Ile Asp
 370 375 380
 Gly Tyr Asp Ile Glu Pro Asn Thr Ile Val Tyr Val Asn Val Trp Ala
 385 390 395 400
 Ile Ser Arg Asp Lys Asp Phe Trp Glu Asn Pro Asp Glu Phe Leu Pro
 405 410 415
 Glu Arg Phe Leu Asn Ser Ser Val Asp Phe Lys Gly Gln Asp Phe Gly
 420 425 430
 Phe Leu Pro Phe Gly Ser Gly Arg Arg Val Cys Pro Gly Met Ala Leu
 435 440 445
 Gly Thr Ala Glu Val Glu Val Ser Leu Ala Asn Ile Leu Tyr Cys Phe
 450 455 460
 His Trp Glu Leu Pro Pro Gly Met Val Glu Asp Asp Val Asp Met Asp
 465 470 475 480
 Phe Leu Pro Gly Ile Thr Thr His Lys Lys Asn Ala Leu Tyr Leu Met
 485 490 495
 Ala Lys Ser Tyr Leu
 500

<210> 55

<211> 1548

<212> DNA

<213> Sesamum indicum

<400> 55

atggtgggaa ttgtgtatat tgagcttttc ttgtcagtta tgtggtttat ggctttgtgg 60

gtgtggttga attacagggc cctggcgtgg aactggcctg tgatcggaat gctgccgacg 120

cttctgcttc acgtgagccg gattcacgac aattgcacgg agattatggg gaagtcccga 180

cggggaactt ttcatttccg ggggtccctgg ttggctgata tggacatgat ggggactgct 240
 gatcctgaga atgttcaacta cattatgagc gcgaacttcc agaatttccc gaaaggcccc 300
 aagttcaggg aaatttttga tgttcttggg gatgggattt tcaatgcaga ttcggagttcc 360
 tggagggacc agagaagggt tgccagggcc ctgatttctc accatgggtt cctccggttt 420
 ctggcgaaga tcagccgtga gaaggtagag aaaggcctga ttccagttct tgaaacgggtg 480
 tgcctggaaa atcgggtggt cgatttgcag gatttgttcc agaggttgac gtttgataca 540
 acttgtagat ttgttactgg ttatgatcct ggatgcttgt ctgttgattt gcctgatgtt 600
 cttttctcga aagccctaga tgatgccgaa gaagcgatat tcatgcgcca tgtggttctt 660
 . gaaaagattt ggaaacttca gaggtgggtt ggggttggat ctgagagaaa attgagcaag 720
 gtcctgaag tcttggatag cgtcattggc aggtatatcg cgctgaagcg cggcgaaatg 780
 agaagccgag gaatttcgat tgattgtgaa aatgaagatg gtgtggatct gctcacgtct 840
 tacatgactg tgggagacga tggtagtcaa acccatgatt tgaaatgtga tgacaagttc 900
 ttgagggaca cgatactgaa tctaattgatt gcagggcggg acacgacgag ttctgctctg 960
 acatggttta tatggcttgt gtcgacacat gctgaagtgg aaaagaggat cagggatgaa 1020
 ctgaagtcct ttctgcccgc cggagaacgt gaaaagtggc gtgtgtttgg ggttgaagaa 1080
 accaagaagt tggtttacat gcatggagca atttgcgaag ccctacgact atatccacca 1140
 gtcccgttcc agcataagga gccggtggaa ccagatatcc ttccgagcgg gcattttgtg 1200
 gaaccgacaa tgaaagtgat gttctcattg tacgccatgg gacggatgga atccgtttgg 1260
 ggcgaggatt gcttggaaat caagccggag aggtggattt ctgatagggg atcgatcaag 1320
 cagagccct catacaagtt cttggctttc aatgctggtc cgaggacttg cttggggaag 1380
 gatgtggctt tcgctcaggt gaaggcagtg gccgccacct taatccataa ctaccaagtt 1440
 cacgtggcag acggccaccg cgtgctgccc aattgttcca tcatcctcta catgaggaat 1500
 ggattgaagg ttagggttgc caatagatgg tctgctaaga aaaattga 1548

<210> 56

<211> 515

<212> PRT

<213> Sesamum indicum

<400> 56

Met Val Gly Ile Val Tyr Ile Glu Leu Phe Leu Ser Val Met Trp Phe
 1 5 10 15

Met Ala Leu Trp Val Trp Leu Asn Tyr Arg Ala Leu Ala Trp Asn Trp
 20 25 30

Pro Val Ile Gly Met Leu Pro Thr Leu Leu Leu His Val Ser Arg Ile
 35 40 45

His Asp Asn Cys Thr Glu Ile Met Gly Lys Ser Arg Arg Gly Thr Phe
 50 55 60

His Phe Arg Gly Pro Trp Leu Ala Asp Met Asp Met Met Gly Thr Ala
 65 70 75 80

Asp Pro Glu Asn Val His Tyr Ile Met Ser Ala Asn Phe Gln Asn Phe
 85 90 95

Pro Lys Gly Pro Lys Phe Arg Glu Ile Phe Asp Val Leu Gly Asp Gly

100

105

110

Ile Phe Asn Ala Asp Ser Glu Ser Trp Arg Asp Gln Arg Arg Val Ala
 115 120 125

Arg Ala Leu Ile Ser His His Gly Phe Leu Arg Phe Leu Ala Lys Ile
 130 135 140

Ser Arg Glu Lys Val Glu Lys Gly Leu Ile Pro Val Leu Glu Thr Val
 145 150 155 160

Cys Leu Glu Asn Arg Val Val Asp Leu Gln Asp Leu Phe Gln Arg Leu
 165 170 175

Thr Phe Asp Thr Thr Cys Thr Phe Val Thr Gly Tyr Asp Pro Gly Cys
 180 185 190

Leu Ser Val Asp Leu Pro Asp Val Pro Phe Ser Lys Ala Leu Asp Asp
 195 200 205

Ala Glu Glu Ala Ile Phe Met Arg His Val Val Pro Glu Lys Ile Trp
 210 215 220

Lys Leu Gln Arg Trp Phe Gly Val Gly Ser Glu Arg Lys Leu Ser Lys
 225 230 235 240

Ala Arg Glu Val Leu Asp Ser Val Ile Gly Arg Tyr Ile Ala Leu Lys
 245 250 255

Arg Gly Glu Met Arg Ser Arg Gly Ile Ser Ile Asp Cys Glu Asn Glu
 260 265 270

Asp Gly Val Asp Leu Leu Thr Ser Tyr Met Thr Val Gly Asp Asp Gly
 275 280 285

Thr Gln Thr His Asp Leu Lys Cys Asp Asp Lys Phe Leu Arg Asp Thr
 290 295 300

Ile Leu Asn Leu Met Ile Ala Gly Arg Asp Thr Thr Ser Ser Ala Leu
 305 310 315 320

Thr Trp Phe Ile Trp Leu Val Ser Thr His Ala Glu Val Glu Lys Arg
 325 330 335

Ile Arg Asp Glu Leu Lys Ser Phe Leu Pro Ala Gly Glu Arg Glu Lys
 340 345 350

Trp Arg Val Phe Gly Val Glu Glu Thr Lys Lys Leu Val Tyr Met His
 355 360 365

Gly Ala Ile Cys Glu Ala Leu Arg Leu Tyr Pro Pro Val Pro Phe Gln
370 375 380

His Lys Glu Pro Val Glu Pro Asp Ile Leu Pro Ser Gly His Phe Val
385 390 395 400

Glu Pro Thr Met Lys Val Met Phe Ser Leu Tyr Ala Met Gly Arg Met
405 410 415

Glu Ser Val Trp Gly Glu Asp Cys Leu Glu Phe Lys Pro Glu Arg Trp
420 425 430

Ile Ser Asp Arg Gly Ser Ile Lys His Glu Pro Ser Tyr Lys Phe Leu
435 440 445

Ala Phe Asn Ala Gly Pro Arg Thr Cys Leu Gly Lys Asp Val Ala Phe
450 455 460

Ala Gln Val Lys Ala Val Ala Ala Thr Leu Ile His Asn Tyr Gln Val
465 470 475 480

His Val Ala Asp Gly His Arg Val Leu Pro Asn Cys Ser Ile Ile Leu
485 490 495

Tyr Met Arg Asn Gly Leu Lys Val Arg Val Ala Asn Arg Trp Ser Ala
500 505 510

Lys Lys Asn
515

<210> 57

<211> 1497

<212> DNA

<213> Sesamum indicum

<400> 57

atggatctac tactttccct tgttctccta ctctgttctg cagcatgcat ttggtttctc 60
cgggtggtcc tgaaacccaa tccagggccc cggaaatcag ccaatctccc tccagggcca 120
aaacctcttc ccataatcgg caacattctt gagcttggtg agaaacccca ccaatctctc 180
gccaaactct ccaaaacctt cgggcccctg atgcgtctca agctgggaac catgacaaca 240
gttggtgtat cctccccgga aatctccagg atcgtgctgc aacaatatga ccaagttttc 300
tccagccgaa cacacgcaga tgccatccga gcaactgacc accacaaaca ttccgtcgcc 360
tggtatccgg cggacaatca gtggcggaaa atccgtaaac tgtgcaaaga gaagatgttt 420
tcgggccaaa agcttgatgc gaaccagggc ctgaggaggg agaagttgcg taatttgcaa 480
gactatgtga atgaatgtg cgtagtggtg caggtcgtgg atattggtgt agctgccttt 540
acgacgacct ttaatctgat atcggccact cttttctcgg tggattttgc tgattttggt 600
tctggttcgt ctcaagagct taaggatgtt atgagcggga tagcgtctat catcggccga 660
ccaaattttg ctgattgttt ccctcttctt cggctggttg atccacaggg catcttccgc 720
cagaccacgt tacatttcaa caagtgtttt aagatctttg atgaaattat ccgtcaaagg 780

ctacagacca atgattcggg gacgaaaagt gacatgctga aagagcttct tgaaatcaac 840
 cagaaagatg agtctgaatt gagctttgac gagatcaagc atttactcct ggatctactt 900
 gtcgcaggaa cggacacaac ttcagttaca gtggaatggg caatgacgga gctagtgcgc 960
 caccctgaga aaatgtcgaa agccagaaat gagttaagaa atgtggtggg actgaataaa 1020
 gaaattcaag aatcagacat ctcaagactc ccttacctac gagcagtggg gaaagaaaagt 1080
 ttcaggcttc accctgcaac tcctttatcg gtacctcaca aggccgacga ggaagcagaa 1140
 atcaatggct atatatgtccc taaaggagca caagttctca tgaacgtgtg ggccatcggc 1200
 agagattcaa gcatatggag gaaccctgat gtattcatgc ccgagagggt cttggagaca 1260
 gaaattgatg tccgtggcca acacttcgag ctgcttcctt ttggcggggg gaggaggatt 1320
 tgcgtggggc tgccgttagc ctatcgtatg atccatctcg tgcttgccac tttcataagc 1380
 gactatgatt ggaaacttga aggagggctg aaaactgaag aaatggacat gagtgaanaag 1440
 ttcggcctca ccctgcaaaa agccattcct ctcaaggcac ttccagttaa aatttag 1497

<210> 58

<211> 498

<212> PRT

<213> Sesamum indicum

<400> 58

Met Asp Leu Leu Leu Ser Leu Val Leu Leu Leu Cys Ser Ala Ala Cys
 1 5 10 15

Ile Trp Phe Leu Arg Val Val Leu Lys Pro Asn Pro Gly Pro Arg Lys
 20 25 30

Ser Ala Asn Leu Pro Pro Gly Pro Lys Pro Leu Pro Ile Ile Gly Asn
 35 40 45

Ile Leu Glu Leu Gly Glu Lys Pro His Gln Ser Leu Ala Lys Leu Ser
 50 55 60

Lys Thr Tyr Gly Pro Leu Met Arg Leu Lys Leu Gly Thr Met Thr Thr
 65 70 75 80

Val Val Val Ser Ser Pro Glu Ile Ser Arg Ile Val Leu Gln Gln Tyr
 85 90 95

Asp Gln Val Phe Ser Ser Arg Thr His Ala Asp Ala Ile Arg Ala Leu
 100 105 110

Asp His His Lys His Ser Val Ala Trp Ile Pro Ala Asp Asn Gln Trp
 115 120 125

Arg Lys Ile Arg Lys Leu Cys Lys Glu Lys Met Phe Ser Gly Gln Lys
 130 135 140

Leu Asp Ala Asn Gln Gly Leu Arg Arg Glu Lys Leu Arg Asn Leu Gln
 145 150 155 160



Asp Tyr Val Asn Glu Cys Cys Val Ser Gly Gln Val Val Asp Ile Gly
 165 170 175
 Val Ala Ala Phe Thr Thr Thr Leu Asn Leu Ile Ser Ala Thr Leu Phe
 180 185 190
 Ser Val Asp Phe Ala Asp Phe Gly Ser Gly Ser Ser Gln Glu Leu Lys
 195 200 205
 Asp Val Met Ser Gly Ile Ala Ser Ile Ile Gly Arg Pro Asn Phe Ala
 210 215 220
 Asp Cys Phe Pro Leu Leu Arg Leu Val Asp Pro Gln Gly Ile Phe Arg
 225 230 235 240
 Gln Thr Thr Leu His Phe Asn Lys Cys Phe Lys Ile Phe Asp Glu Ile
 245 250 255
 Ile Arg Gln Arg Leu Gln Thr Asn Asp Ser Gly Thr Lys Ser Asp Met
 260 265 270
 Leu Lys Glu Leu Leu Glu Ile Asn Gln Lys Asp Glu Ser Glu Leu Ser
 275 280 285
 Phe Asp Glu Ile Lys His Leu Leu Leu Asp Leu Leu Val Ala Gly Thr
 290 295 300
 Asp Thr Thr Ser Val Thr Val Glu Trp Ala Met Thr Glu Leu Val Arg
 305 310 315 320
 His Pro Glu Lys Met Ser Lys Ala Arg Asn Glu Leu Arg Asn Val Val
 325 330 335
 Gly Leu Asn Lys Glu Ile Gln Glu Ser Asp Ile Ser Arg Leu Pro Tyr
 340 345 350
 Leu Arg Ala Val Val Lys Glu Ser Phe Arg Leu His Pro Ala Thr Pro
 355 360 365
 Leu Ser Val Pro His Lys Ala Asp Glu Glu Ala Glu Ile Asn Gly Tyr
 370 375 380
 Ile Val Pro Lys Gly Ala Gln Val Leu Met Asn Val Trp Ala Ile Gly
 385 390 395 400
 Arg Asp Ser Ser Ile Trp Arg Asn Pro Asp Val Phe Met Pro Glu Arg
 405 410 415
 Phe Leu Glu Thr Glu Ile Asp Val Arg Gly Gln His Phe Glu Leu Leu
 420 425 430

Pro Phe Gly Gly Gly Arg Arg Ile Cys Val Gly Leu Pro Leu Ala Tyr
 435 440 445

Arg Met Ile His Leu Val Leu Ala Thr Phe Ile Ser Asp Tyr Asp Trp
 450 455 460

Lys Leu Glu Gly Gly Leu Lys Thr Glu Glu Met Asp Met Ser Glu Lys
 465 470 475 480

Phe Gly Leu Thr Leu Gln Lys Ala Ile Pro Leu Lys Ala Leu Pro Val
 485 490 495

Lys Ile

<210> 59

<211> 1548

<212> DNA

<213> Sesamum indicum

<400> 59

```

atggcaaacc ccattgattt tctcctcagc ccaacacccat atgtggctac aacccttctt 60
tacgttctct tctctgttct tattgttaga ttctcagca gaaagctgct cgggaagaag 120
aggtaccatc ccattgggtg taccgtgttc aaccagctgc tgaacttcta taggttgc 180
gattatatgg ctgatcttgc agggaagtac aagacttaca gactgattgc cccttttcgg 240
actgaggtct atacatctga ccccgcta atgtgagcaca tgttgaaaac gaatttcgaa 300
agttatggca agggacctta caattgcagc attctggggg atttgtttgg tgaaggaatt 360
ttcgcaatcg atggccataa gtggaggagg cagagaaaag tgtcaagcct tgagttttct 420
acaagggttc tgagggatta cagtagcatc gtcttcagga aaaacgccgt aaggctcgca 480
aaaattctgt ctggagctgc aacttccaac caaccagtgg atattcaaga tcttttcag 540
aatcaactt ttgattctat ttcggaagt gctttaggag ttgagcttga cagcttgggt 600
ggttcaa atg aagaaggtgc caaatttagc attgctgcag acgacgtgag tatgaggaca 660
ctttggagat acgtggatgt tctgtggaag ttaaagagag ctctaaatgt tggttcagaa 720
gcaaaactga agaaaagcct tcaagtgggt gatgaattt tgtataagct gattcatagt 780
aggactcagc aatgaacat gccaggaaat gattctgtta tgcagctgaa gaaagacgac 840
atittgtcaa gattcttgca acttactgag gccactccca agtacttgag ggacataaca 900
ataagcttta tagttgctgg taaagacaca acagcaacaa ctctctcttg gtttatttac 960
atgctttgca agtatcctca tgttcaggaa aaggtggagc aagagataaa agatgcgaca 1020
ggctgcaaag aggtagcaga tatctcagaa ttttcagcct gtgtgacaga agaagctttg 1080
ggcaagatgc attatctcca tgcagcattg acagaaacac tgaggattta tccagcagtt 1140
gcggtggatg caaagcaatg tttgtgtgat gatataatgc cggatgggtt cagtgttaag 1200
aaggggggaca tgggtggctta tcaaccatat gcaatgggaa ggatgaaatc catatgggggt 1260
aatgatgcag aagagttcaa accagagaga tggcttgaca aaaacggttg cttccagcag 1320
gccagccctt ttaagtttac agctttccag gccggccctc gtctttgttt ggggaaagag 1380
tttgcttatc ggcagatgaa gatattctca gccattctgc tgagattctt taccatgaaa 1440
ctaagtgatg aaagaaagac agtaaactac agaccaatgc tcactcttct catcgacggt 1500
ggtctcattg tccgccctt tcaagaatg gacgagaaaa ctgcatga 1548

```

<210> 60
 <211> 515
 <212> PRT
 <213> Sesamum indicum

<400> 60

Met Ala Asn Pro Ile Asp Phe Leu Leu Ser Pro Thr Pro Tyr Val Ala
 1 5 10 15

Thr Thr Leu Leu Tyr Val Leu Phe Ser Val Leu Ile Val Arg Phe Leu
 20 25 30

Ser Arg Lys Leu Leu Gly Lys Lys Arg Tyr His Pro Ile Gly Gly Thr
 35 40 45

Val Phe Asn Gln Leu Leu Asn Phe Tyr Arg Leu His Asp Tyr Met Ala
 50 55 60

Asp Leu Ala Gly Lys Tyr Lys Thr Tyr Arg Leu Ile Ala Pro Phe Arg
 65 70 75 80

Thr Glu Val Tyr Thr Ser Asp Pro Ala Asn Val Glu His Met Leu Lys
 85 90 95

Thr Asn Phe Glu Ser Tyr Gly Lys Gly Pro Tyr Asn Cys Ser Ile Leu
 100 105 110

Gly Asp Leu Phe Gly Glu Gly Ile Phe Ala Ile Asp Gly His Lys Trp
 115 120 125

Arg Glu Gln Arg Lys Val Ser Ser Leu Glu Phe Ser Thr Arg Val Leu
 130 135 140

Arg Asp Tyr Ser Ser Ile Val Phe Arg Lys Asn Ala Val Arg Leu Ala
 145 150 155 160

Lys Ile Leu Ser Gly Ala Ala Thr Ser Asn Gln Pro Val Asp Ile Gln
 165 170 175

Asp Leu Phe Met Lys Ser Thr Phe Asp Ser Ile Ser Glu Val Ala Leu
 180 185 190

Gly Val Glu Leu Asp Ser Leu Gly Gly Ser Asn Glu Glu Gly Ala Lys
 195 200 205

Phe Ser Ile Ala Ala Asp Asp Val Ser Met Arg Thr Leu Trp Arg Tyr
 210 215 220

Val Asp Val Leu Trp Lys Leu Lys Arg Ala Leu Asn Val Gly Ser Glu

225	230								235				240				
Ala	Lys	Leu	Lys	Lys	Ser	Leu	Gln	Val	Val	Asp	Glu	Phe	Val	Tyr	Lys		
				245					250					255			
Leu	Ile	His	Ser	Arg	Thr	Gln	Gln	Met	Asn	Met	Pro	Gly	Asn	Asp	Ser		
				260					265					270			
Val	Met	Gln	Leu	Lys	Lys	Asp	Asp	Ile	Leu	Ser	Arg	Phe	Leu	Gln	Leu		
				275					280					285			
Thr	Glu	Ala	Thr	Pro	Lys	Tyr	Leu	Arg	Asp	Ile	Thr	Ile	Ser	Phe	Ile		
				290					295					300			
Val	Ala	Gly	Lys	Asp	Thr	Thr	Ala	Thr	Thr	Leu	Ser	Trp	Phe	Ile	Tyr		
305					310					315					320		
Met	Leu	Cys	Lys	Tyr	Pro	His	Val	Gln	Glu	Lys	Val	Glu	Gln	Glu	Ile		
				325					330					335			
Lys	Asp	Ala	Thr	Gly	Cys	Lys	Glu	Val	Ala	Asp	Ile	Ser	Glu	Phe	Ser		
				340					345					350			
Ala	Cys	Val	Thr	Glu	Glu	Ala	Leu	Gly	Lys	Met	His	Tyr	Leu	His	Ala		
				355					360					365			
Ala	Leu	Thr	Glu	Thr	Leu	Arg	Ile	Tyr	Pro	Ala	Val	Ala	Val	Asp	Ala		
				370					375					380			
Lys	Gln	Cys	Leu	Cys	Asp	Asp	Ile	Met	Pro	Asp	Gly	Phe	Ser	Val	Lys		
385					390					395					400		
Lys	Gly	Asp	Met	Val	Ala	Tyr	Gln	Pro	Tyr	Ala	Met	Gly	Arg	Met	Lys		
				405					410					415			
Ser	Ile	Trp	Gly	Asn	Asp	Ala	Glu	Glu	Phe	Lys	Pro	Glu	Arg	Trp	Leu		
				420					425					430			
Asp	Lys	Asn	Gly	Cys	Phe	Gln	Gln	Ala	Ser	Pro	Phe	Lys	Phe	Thr	Ala		
				435					440					445			
Phe	Gln	Ala	Gly	Pro	Arg	Leu	Cys	Leu	Gly	Lys	Glu	Phe	Ala	Tyr	Arg		
				450					455					460			
Gln	Met	Lys	Ile	Phe	Ser	Ala	Ile	Leu	Leu	Arg	Phe	Phe	Thr	Met	Lys		
465					470					475					480		
Leu	Ser	Asp	Glu	Arg	Lys	Thr	Val	Asn	Tyr	Arg	Pro	Met	Leu	Thr	Leu		
				485					490					495			




Leu Ile Asp Gly Gly Leu Ile Val Arg Pro Phe His Arg Met Asp Glu
 500 505 510


Lys Thr Ala
 515

【書類名】 図面


【図1】



【図 2】



【図 3】



【図 4】

> Blastx Search (SST vs PIR)

030709 update

Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), "Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= BXP184.2003.08.12
(1521 letters)

Database: pir1.fst; pir2.fst; pir3.fst; pir4.fst
283,329 sequences; 96,175,589 total letters

Searching.....done

Sequences producing significant alignments:		Score	E
		(bits)	Value
<u>T04730</u>	(PIR) cytochrome P450 homolog F6G17.10 - Arabidopsis thal...	<u>494</u>	e-139
<u>C85441</u>	(PIR) cytochrome P450-like protein [imported] - Arabidopsis	<u>494</u>	e-139
<u>T52174</u>	(PIR) cytochrome P450 monooxygenase [imported] - Arabidopsis	<u>487</u>	e-137
<u>B85441</u>	(PIR) cytochrome P450-like protein [imported] - Arabidopsis	<u>481</u>	e-135
<u>T04731</u>	(PIR) cytochrome P450 homolog F6G17.20 - Arabidopsis thal...	<u>480</u>	e-135
<u>T10896</u>	(PIR) cytochrome P450 (EC 1.14.-.-) 81B1c - Jerusalem art...	<u>468</u>	e-131
<u>A85441</u>	(PIR) cytochrome P450-like protein [imported] - Arabidopsis	<u>464</u>	e-130
<u>T00510</u>	(PIR) probable cytochrome P450 At2g23220 [imported] - Ara...	<u>457</u>	e-128
<u>T00513</u>	(PIR) cytochrome P450 homolog At2g23190 - Arabidopsis tha...	<u>453</u>	e-127
<u>B96691</u>	(PIR) probable cytochrome P450 F28G11.4 [imported] - Arab...	<u>444</u>	e-124

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ピノレジノールからピペリトールおよびピペリトールからセサミンへの反応を触媒する酵素の遺伝子を得ることを目的とする。

【解決手段】 ゴマ種子 cDNA ライブラリーからゴマ種子チトクローム P 450 遺伝子群 (S i P 遺伝子) を取得し、酵母において発現させた。その組換え酵母からミクロソーム画分を回収し、ピノレジノールまたはピペリトールと反応させ、それぞれからピペリトールまたはセサミンが生成されるかどうかを H P L C により分析した。その結果、ピノレジノールからピペリトールおよびピペリトールからセサミンへの二つの反応を触媒するタンパク質および当該タンパク質をコードする遺伝子を取得した。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 3 - 3 4 1 3 1 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 1 9 0 4]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 1 3 日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市北区堂島浜 2 丁目 1 番 4 0 号
氏 名 サントリー株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.